TYD-WYZER
DER
RUPSEN,
VERVATTENDE, VAN MAAND TOT MAAND, DEN TYD DER VERSCHYNING VAN DE, DOOR

RÖSEL EN KLEEMANN,

BESCHREEVEN EN AFGEBEELDE RUPSEN, BENEVENS HAAR VOEDZEL.

Ten nutte en dienst der Lief hebbers opgesteld, door den Heer

JOHANN MADER,

Raad en Opper-Amptman van den Vryheer van
KNIESTAD.

EN IN 'T LICHT GEGEEVEN DOOR

C. F. C. KLEEMANN,

Lid van het Koninglyke Gezelschap der Natuuronderzoeking te Berlin.

Uit het Hoogduitsch.

VERMEERDERD MET EENE

NAAMLYST DER PLANTEN,

VOLGENS HET SAMENSTEL VAN

LINNÆUS.

Te Haarlem, by C. H. *BOHN*, Boekverkooper
MDCCLXXIX.



VOORBERICHT

VAN DEN HEER

CHR. FR. CAREL KLEEMANN,

Nopens den *Tydwyzer der Rupſen.*

Verſcheiden Liefhebbers van Röſels *Natuurlyke Hiſtorie der Inſecten, en myner Byvoegzelen, zo wel als andere Natuurkundigen, mitsgaders veele ſchrandere Geleerden, welken veel achting hebben voor de Werken van* RÖSEL., *zo om zyne gegronde Natuurkundige beſchryving, als om zyne onnavolgbaare en welgelukte Afbeeldingen der Inſecten; hebben ſedert lang gewenſcht, dat iemand de moeite op zich name, om de van hem, ten aanzien der Rupſen, genoemde Jaargetyden en Maanden, op eene regelmaatige wyze in orde te brengen; en de Verzamelaars van diergelyke Inſecten, met een welgeſchikten* Tydwyzer, *in een kleiner formaat, te voorzien.*

Deze Wenſch is eindelyk, door iemand in Stutgard *woonachtig, en in veele opzichten reets genoegzaam beroemd zynde Raadsheer en Vryheerlyken Knieſtadſchen Opper-Amptman, den Heer* JOHAN MADER, *vervuld. Dezelve heeft my, al eenigen tyd geleeden, de eer aangedaan, van my zulk een langbegeerden* Tydwyzer der Rupſen *ter hand te ſtellen; dien ik thans den Liefhebberen der Inſecten door den Druk mededeele; terwyl ik teffens den Heer Opſteller hier mede vriendlyk dank betuige; gemerkt hy het Algemeen, door dezen zynen arbeid, buiten tegenſpraak, zeer veel dienſt gedaan heeft.*

De Heer Opſteller bedoelde hier mede nuttig te zyn, aan alle zodanige Liefhebbers, die eene Verzameling van prachtige en bontverwige Vlinders of Kapellen aanleggen; en dezelven uit de Rupſen teelen willen; op dat ze hunne volmaakte ſchoonheid behouden, en de koleuren, hunner vleugelen door het vliegen of paaren niet affchaaven mogen; als mede om hunne wonderbaare Verandering te zien. Het oogmerk is, denzulken het opzoeken der Rupſen gemaklyker te

te maaken. Ik hebbe 'er wyders de vreemde Naamen, welken de doorgeleerde Natuurkenner en nu onlangs overleeden Heer LINNÆUS, *in de twaalfde uitgaaf zyner Insecten. Systema, aan dezelven gegeeven heeft, bygevoegd; het welk den Liefhebberen, zo ik hoope, niet onaangenaam zal weezen. Byaldien ik daaromtrent in 't een of ander mogte gemist hebben, staat zulks den Liefhebberen, behalve door het Naamregister der* Röselsche *Vlinders, volgens de benoeming van den Heer* LINNÆUS, *(dat ik ook gebruikt hebbe,) door den Heer Pastor* GOEZE, *in het VII. en IXde Stuk van zynen overheerlyken Walchischen Natuur-Onderzoeker geplaatst, nog door een volkomen Naamregister over de* Röselsche *Insecten en myne Byvoegzels, vergoed te worden; het welk de voornoemde Heer Pastor op nieuw uitwerken, en, volgens belofte, my mededeelen zal.*

Betreffende de Maanden, in dezen Tydwyzer *vervat, moete ik aanmerken, dat de Heer Opsteller, (als bedoelende alleen eene aanwyzing der Maanden, in welken* RÖSEL *of andere Vrienden, die de uitvoering zyner Wer-*

ken, door de mededeeling van verſcheiden Rupſen, begunſtigden, de daarin afgebeelde Rupſen gevonden hebben;) enkel de in 't Werk van RÖSEL *gemelde tyden bygebragt heeft. Dan vermits 'er, inzonderheid uit de* Röſelſche 1ſte *en* 2de *Claſſe der Dagvlinders, jaarlyks, eene dubbele voortteeling geſchiedt, en de Rups zich derhalve jaarlyks tweemaal inſpint; zo zal men ook in dezen* Tydwyzer *verſcheiden Rupſen, in verſchillende jaargetyden en maanden, weder aantreffen. Hierbenevens zal, aangezien het Weer in alle jaarſaizoenen niet eveneens is, menig Verzamelaar der* Röſelſche *Rupſen dezelven niet alle jaaren, in de door hem opgegeeven maanden; maar deels vroeger en deels laater, naar maate dat het Weer voor- of nadeelig zy, konnen vinden.*

Voorts hebbe ik, by de boomen, ſtruiken en planten, door den Heer RÖSEL *opgegeeven, hier en daar, volgens eigen ondervinding, nog eenige anderen gevoegd; het welk den Liefhebberen tot eene handleiding kan ſtrekken, om de gezogte Rups, indien ze dezelve by ongeluk, niet op de eene plant aantreffen, mogelyk op de*

an-

andere te vinden. Hierdoor kan deze Tydwyzer, *by toeval, ook aan een anderen kant nut en dienſtig worden; met den eenen of anderen, by de opzoeking van eene in gedachten hebbende Rups, te eerder gelegenheid te geeven, om eene nieuwe en onbekende te ontdekken, ſchoon men die van de* Röſelſche *Afbeeldingen niet mogte aantreffen.*

Wat wel byzonder aangaat, de manier, op welke de Verzamelaars de Voortteeling der Rupſen t'huis moeten behandelen; ik zal my hierover, als niet behoorende tot myn tegenwoordig oogmerk, niet breedvoerig uitlaaten; en, in plaats van veele anderen, alleenlyk deze weinige Regelen desaangaande voorſtellen. 1. *Men moet de Rupſen dagelyks tweemaal met friſch voeder voorzien:* 2. *Die genen, welken onder de Aarde veranderen, in een ruim met friſſe, iets vochtige, en van alle Inſecten wel gezuiverde Aarde gevuld Glas plaatzen:* 3. *Haar Verblyf vlytig zuiveren van haaren drek: en,* 4. *De Rupſen, die geen gezellig leven leiden, ook alleen laaten, en 'er geen anderen by doen.*

Ein-

Eindelyk wenſche ik nietsmeer, dan dat deze Tydwyzer der Rupſen *het daar mede beoogde doelwit bereiken, en den Liefhebberen in ſtaat ſtellen moge, om niet alleen de door* RÖSEL *afgebeelde, maar ook nog andere door hem niet afgebeelde Vlinders, uit hunne Rupſen, te erlangen. En teffens verzekere ik, dat myne* Byvoegzels, *zodra de Hollandſche Uitgave der Vier Deelen van* RÖSEL *voltrokken zy, op dezelven zullen volgen.*

NB. *De Aantekeningen, welken hier en daar onder op de bladzyden voorkomen, zyn mede meeſtal van den Heer* KLEEMANN.

TYDWYZER DER RUPSEN.

MAART.

BESCHRYVINGE.

I.

Voedzel.

Haare ſpyze beſtaat in Muurbloemen, roode Kool, loof van Sellery, Aardbezien, Duizendblad, allerhande Moeskruiden, enz.

De gladde groene Rups, met den bruinen kop, witte afgebroken Ruglinie, geele punten, en zydelinie van gelyke koleur*, waaruit de tot de tweede Claſſe der Nachtvlinders behoorende Vlinder voortkomt; by *Linnæus*, METICULOSA p. 845. ſp. 132. de *Vreesagtige*.

Röſel.

IV. Deel. *Tab.* IX. *Fig.* 1-5.

* Deze Rups overwintert; doch zy vertoont zich echter doorgaans van *Maart* tot in *Juny* nog; en wordt ook wel geelachtig-bruin, met donkere ſchuinsloopende Rugſtreepen, gevonden. Zy eet allerhande Moeskruiden en duizend andere Gewaſſen. In myne *Byvoegzelen* zal ik ook haare verſchillende koleur aantoonen.

MAART.

BESCHRYVINGE.

2.

Voedzel.

Haar Voedzel vindt ze in de tweejaarige takken van den veeltyds genaamden Dwerg-Appel, of Rooden-Appel. (*Mala Pumilia.*)

*De ſchoone hoog geele Hout-Rups** van den Vlinder, tot de tweede Claſſe der Nachtvlinders behoorende. ÆSCULI, *Linn.* p. 833. ſp. 83. *de Land-Tyger.*

Röſel.

III. Deel. *Tab.* XLVIII. *Fig.* 5-6.

3.

Zy geneert zich met de bladen van de Wollige Wilgen, Jonge Eiken, Esſen- en Beukeboomen; mitsgaders met die van Roozen, en Aardbeziën, met Brandnetels enz.

De zwarte Rups, met de drievoudige geele boordzels, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders. DOMINULA, *Linn.* p. 834. ſp. 90 *'t Juffertje.*

III. Deel. *Tab.* XLVII. *Fig.* 1-5.

* Van deze Rups heeft de Heer *van Rottemburg*, in het IX Stuk van *Walchs* voortreffelyken Natur-forſcher *pag.* 114. nog aangemerkt, dat ze grooter wordt, dan *Röſel* dezelve heeft afgebeeld.

APRIL.

BESCHRYVINGE.

4.

Voedzel.

Haare ſpyze beſtaat in Muurbloemen, roode Kool, loof van Sellery, Aardbezien, Duizendblad, allerhande Moeskruiden, enz.

De gladde groene Rups, met den bruinen kop enz. die wy reets in *Maart* No. 1. beſchreeven hebben, wordt voornaamentlyk in deze maand gevonden, en daarom hier herhaald.

Röſel.

IV. Deel. *Tab.* IX. *Fig.* 1-5.

5.

Tuin-Salade, Duizendblad, enz.

De zeldzaame bruinachtige Beerenrups, met den rooden kop en pooten, van den Vlinder der tweede Claſſe der Nachtvlinders. VILLICA, *Linn.* p. 820. ſp. 41. de *Zwarte Beer*, of de *Roomvlak.*

IV. Deel. *Tab.* XXIX. *Fig.* 1-4. en *Tab.* XXVIII. *Fig.* 2.

APRIL.

BESCHRYVINGE.

6.

Voedzel.		*Röſel.*
Alle ſoorten van Ecrenprys, Muisoor, enz.	*De kleine zwarte* met veele witte punten beſprengkelde *Doorn-Rups*, met den rooden kop en pooten; behoorende tot de eerſte Claſſe der Dagvlinders; CINXIA, *Linn.* p. 784. ſp. 205. de *Gebandeerde Mantel*	IV. Deel. *Tab.* XXIX. *Fig.* A. B. C. D. als mede *Tab* XIII. *Fig.* 4-7.

7.

Het Muizenooren Kruid, enz.	*De groenachtig-geele Rups*, met afgezette zwarte ſtreepen; behoorende tot de tweede Claſſe der Nachtvlinders; PRONUBA, *Linn.* p. 842. ſp. 121. *Hooy-Uil.*	IV. Deel. *Tab.* XXXII. *Fig.* 1-6.

MAI.

Voedzel.	Beschryvinge.	*Röſel.*
	8.	
Wolfsmelk, wilde Byvoet, Kweek - gras, Boſch - gras, Tuin - Salade, en Duizendblad.	De met bruinachtig graauwe hairen bezette *Beeren - Rups*, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders. Hebe, *Linnæus* p. 820. ſp. 40.	IV. Deel. *Tab.* XXVII. *Fig* 1 en 2. Zie ook *Kleemanns* byvoegzels; *Tab.* XIII. *Fig.* 1-3.
	9.	
Sleebeziën en Pruimenboomenbladeren, enz.	Het kleine, groene, bultige *Rupsje*, uit de tweede Claſſe der Dagvlinders; Pruni, *Linn.* p. 788. ſp. 221.	I. Deel. 2de Claſſe der Dagvlind. *Tab.* VII. *Fig.* 1-5
	10.	
Allerleie Ooſtboomen,	De ſchadelyke, gezellige en geſtreepte *Ring - Rups*, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders. Neustria, *Linn.* p. 818. ſp. 35. de *Ring - Rups* of *Blaauw-Kop.*	I Deel. 2de Claſſe der Nachtvl. *Tab.* VI. *Fig.* 1-7

MAI.

Beschryvinge.

11.

Voedzel.

Sleestruiken, Pruimen - en Kwetzenboomen enz.

De gladde bleekgroene *Pyramiden-Rups*, van den Vlinder uit de tweede Classe der Nachtvlinders. Pyramidea, *Linn.* p. 856. sp. 181. *'t Pyramideuiltje*, de *Meudonet*, by *l'Admiral*, Tab. II.

Röfel.

I. Deel. 2de Classe der Nachtvl. *Tab.* XI. *Fig.* 1-6

12.

Hagedoorn, *Kattenhout*, enz. Zie No. 3.

De groote, spichtige, aardkoleurige *Pinnen-Rups*, uit de tweede Classe der Nachtvlinders*, Nupta, *Linn.* p. 841. sp. 119. *'t vermiljoen roode Weeskind.*

I. Deel. 2de Classe der Nachtvlinders, *Tab.* XV. *Fig.* 1-5.

* 'Er zyn nog meer Rupsen, zeer gelyk aan deze, die zich op de Essen-Wilgen-en zwarte Popelboomen onthouden; welker Vlinders ook roode ondervleugels hebben, die men voor deze soort niet neemen moet. Ik zal ze in myne *Byvoegzelen* nog vertoonen. *Röfel* heeft 'er eene soort van in 't vierde Deel *Tab.* XIX. afgebeeld. Kl.

MAI.

BESCHRYVINGE.

13.

Voedzel.

Alle Ooftboomen, enz.

De dikke, zeegroene, geel geſtreepte en zwart geſtippelde *Rups*; van den Vlinder tot de tweede Claſſe der Nachtvlinders behoorende; COERULEOCEPHALA, *Linn.* p. 826. ſp. 59. *zonder Zomer.*

Röſel.

I. Deel. 2de Claſſe der Nachtvlinders, *Tab.* XVI. *Fig.* 1-5.

14.

De bladeren van Eiken- en Peerenboomen.

De graauwe, geel- en zwartgeſtreepte, hairige *Rups*, met roode knopjes, van den Vlinder tot de tweede Claſſe der Nachtvlinders behoorende; QUADRA*, *Linn.* p. 840 ſp. 114. de *Vierkantvlak.*

I. Deel. 2de Claſſe der Nachtvlinders, *Tab.* XVII. *Fig.* 1-5.

* *Röſel* heeft 'er alleen het Okergeele Wyfje van afgebeeld, maar 't aſchgraauwe Mannetje niet; het welk ik in myne *Byvoegzelen* zal laaten volgen.

MAI.

Voedzel.	Beschryvinge.	*Röſel.*
	15.	
Wollekruid.	De groene, wit en zwart gevlakte *Rups*, van den Vlinder uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders. VERBASCI, *Linn.* p. 850. ſp. 153. de *Wollekruids-Uil.*	I. Deel. 2de Claſſe der Nachtvlinders, *Tab.* XXIII. *Fig.* 1-5.
	16.	
Appelboomen, Kwetzen-Peeren- en Perſike-boomen.	De helder-graauwe en bruingeruite *Boomrups*, van den tot de tweede Claſſe der Nachtvlinders behoorenden Vlinder; OXIACANTHÆ, *Linn.* p. 852. ſp. 165. de *Hoogſtaart-Uil.*	I. Deel. 2de Claſſe der Nachtvl. *Tab.* XXXIII. *Fig.* 1-6.

MAI.

BESCHRYVINGE.

17.

Voedzel.

Zy geneert zich van de Sleeſtruiken, Framboizen, Kweepeeren- en Perſikeboomen, Eiken- en kleinen Esdoorn, of Booghout (*Aborn*,) Haagedoorn. enz.

De groote Vilthairige, geelbruine *Rups*, van de Slee-en Kweepeeren boomen*, uit de 2de Claſſe der Nachtvlinders. QUERCUS, *Linn.* p. 814. ſp. 25. de *Jaager van den Eyk.*

Röſel.

I. Deel. 2de Claſſe der Nachtvl. *Tab.* XXXV. *a. Fig.* 1-3. *Tab.* XXXV. *b. Fig.* 4-6.

18.

Voedzel.

Gemeen gras, Kweën, Wolle-Willigen, Appelboomen, Kwetzen of Framboizen, Sleebladeren, Pynboom, enz.

De kleiner en ranker bruingeele Vilthairige *Rups*, der Kweepeerenboomen, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders. DUMETI, *Linn.* p. 285. ſp. 55. de *Gras-Jaager.*

Röſel.

I. Deel. 2de Claſſe der Nachtvl. *Tab.* XXXV. *b. Fig.* 1-3. *Tab.* XXXV. *a. Fig.* 4-5.

* De Vlinder van deze Rups is niet dezelfde, welken *Röſel*, benevens deze Rups op *Tab.* XXXV. *a. Fig.* 4. 5. verkeerd heeft afgebeeld; maar die op *Tab.* XXXV. *b. Fig.* 4-6. voorkomt; waartegen de Vlinder van de Rups op *Tab.* XXXV. *b.* afgebeeld, die gene is, welke op *Tab.* XXXV. *a.* Fig. 4. 5. verkeerd geplaatſt is. De Heer *Röſel* heeft de Rupſen dezer beide Nachtvlinders dermaate verwiſſeld, dat de Rups en Pop van den *Jaager van den Eyke*, *Tab.* XXXV. *a. Fig.* 1-3. doch die van den *Gras Jaager* op *Tab.* XXXV. *b. Fig.* 1-3. vertoond worden. De Poppen dezer Rupſen blyven zomtyds twee Winters over liggen, eer de Vlinder daaruit te voorſchyn komt.

MAI.

BESCHRYVINGE.

Voedzel.	19.	*Röſel.*
Wolle Willige, ronde ruige Willige, Eiken, Kwetzen, Pruimen, Roozeſtruiken, Blaauwbezien, Pynboom bladeren.	De graauwe *Borſtel-Rups*, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders; FASCELINA, *Linn.* p. 285. ſp. 55. *Borſtel-Rups* of *bruine Antiek.*	I. Deel. 2de Claſſe der Nachtvl. *Tab.* XXXVII. *Fig.* 1-9.
	20.	
Gemeen gras, enz. zit aan de ſtammen der Eiken-Appel-Peeren-Kwetzen-Sleeboomen, waar van zy de bladeren ect.	De groote hairige en met veele wratten en hairen bezette *Grasrups*, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders; QUERCIFOLIA, *Linn.* p. 812. ſp. 18. het *Eikenblad*, *verdordeblad*, *Le paquet feuilles ſeches.*	I. Deel. 2de Claſſe der Nachtvl. *Tab.* XLI. *Fig.* 1-7.
	21.	
Moſch-Diſtel enz.	De groenachtig-graauw- en oranje geel gekoleurde *Rups*, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders; PRÆCOX, *Linn.* p. 854. ſp. 174	I. Deel. 2de Claſſe der Nachtvl. *Tab.* LI. *Fig.* 1-4

MAI.

BESCHRYVINGE.

Voedzel.		*Röſel.*
	22.	
Kruisbeziën, (*Nepta*,) of Kattenkruid, Zuuring, Sicory Akeley, enz.	De ranke, gladde, grasgroene *Rups*, met den geelen zydenſtreep, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders; CERASI, de *Kerſenuil*, Fabrici *Syſtema Entomolig:* p. 600. Num. 42.	I. Deel. 2de Claſſe der Nachtvl. *Tab.* LV. *Fig.* 1-3.
	23.	
Wollekruid met witte bloemen.	De donkerbruine of zwartachtige *Rups*, met helder-geele ſtreepen, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders. TYPICA, *Linn.* p. 857. ſp. 186.	I. Deel. 2de Claſſe der Nachtvl, *Tab.* LVI. *Fig.* 1-5.
	24.	
Honds- of Kweekgras.	De dikke helder geele en zwartgevlakte *Rups*, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders. SPHINX	I. Deel. 2de Claſſe der Nachtvl. *Tab.* LVII. *Fig.* 1-7.

MAI.

Voedzel.	BESCHRYVINGE.	*Röſel.*
	SPHINX FILIPENDULA, *Linnæus* p. 805. ſp. 34. *het groenglanzige roodgevlakte Duin-Uiltje.*	
	25.	
Appel- Linden- en Eikenboomen.	De Vilthairige graauwe *Rups*, met bruine vlakken en oranjegeele punten, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders; POPULI, *Linn.* p. 818. ſp 34.	I. Deel. 2de Claſſe der Nachtvl. *Tab.* LX. *Fig.* 1-4. en III. Deel. *Tab.* LXXI. *Fig. e.* 7-9.
	26.	
Eikenbladeren.	De gladde bruinroode, met byzondere witte vlakken vercierde, *zwartkoppige Rups* uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders; Oo, *Linn* p. 832. ſp. 81.	I. Deel. 2de Claſſe der Nachtvl. *Tab.* LXIII. *Fig.* 1-4.

MAI.

Voedzel.	BESCHRYVINGE.	*Röſel.*
	27.	
Willigen, Vlier, Kerſen, Kwetzen, Appels, Peeren, Linden, Framboizen-ſtruiken, Elfsrank, Kaaperſoelie, Muisoor, enz.	De groote bruine en donker geſtreepte *Span-Rups*, uit de derde Claſſe der Nachtvlinders; GEOM. SAMBUCARIA, *Linn.* p. 860. ſp. 203. *Puntkapel*, ook *Vliertmeeter*.	I. Deel. 3de Claſſe der Nachtvl. *Tab.* VI. *Fig.* 1-5
	28.	
Appelboomen.	Het dikkere groene *Span-Rupsje*, met den roodden ruggeſtreep, uit de derde Claſſe der Nachtvlinders. SUCCENTURIATA, *Linn.* p. 872. ſp. 267.	I. Deel. 3de Claſſe der Nachtvl. *Tab.* VIII. *Fig.* 1-3.
	29.	
Peerenboomenbladeren, enz.	De groote bruinachtig-graauwe *Spanrups*, met den plat-	I. Deel. 3de Claſſe der Nachtvl. *Tab.* IX. *Fig.* 1-6

MAI.

	BESCHRYVINGE.	
Voedzel.	platten kop. Zy behoort tot de derde Classe der Nachtvlinders, ELINGUARIA, *Linn.* p. 862. sp. 211.	*Röſel.*
	30.	
Eikenbladeren.	De groene *Bladroller*, met kleine zwarte punten, uit de vierde Classe der Nachtvlinders. TORTRIX VIRIDANA, *Linn.* p. 875. sp. 286. de *Groene Bladroller.*	I. Deel. 4de Classe der Nachtvl. *Tab.* I. *Fig.* 1-5.
	31.	
De bladeren van Kerſen- en Eiken-boomen.	De zwarte *Bladroller*, met witte punten, uit de vierde Classe der Nachtvlinders. ROSANA, *Linn.* p. 876. sp. 293.	I. Deel. 4de Classe der Nachtvl. *Tab.* II. *Fig.* 1-4.

MAI.

BESCHRYVINGE.

32.

Voedzel.

Haar voedzel is onbekend; misschien zyn het bladeren van Sleestruiken.

Het kleine dikke bleekgroene *Rupsje*, met bruine punten en heldere streepen, uit de vierde Classe der Nachtvlinders; ALUCILA PENTADACTYLA, *Linn.* p. 900. sp. 459. *Het vyfvederige Penüiltje.*

Röfel.

I. Deel. 4de Classe der Nachtvl. *Tab.* V. *Fig.* 1-3.

33.

Kaaperfoelie en Hoelanger hoeliever.

De groote witachtig bruine gewaterde, met puntjes en knopjes bezette *Spanrups*, uit de derde Classe der Nachtvlinders. SORDIATA, *Linn.* p. 871. sp. 262.

III. Deel. *Tab.* III. *Fig.* 1-3.

34.

Linden- Sleedoorn- en Espen of Raatelaars bladeren.

De ranke bruine *Spanrups*, met witte

III. Deel. *Tab.* IV. *Fig.* 1-3.

MAI.

BESCHRYVINGE.

Voedzel.		*Röſel.*
	te rugge - en zydevlakken ; uit de derde Claſſe der Nachtvlinders ; *Linn.* O.	
	35.	
Linden - en Wilgebladeren.	De bleekgroene *Rups* , met witte liniën, dwarsſtreepen en punten , uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders. *Linn.* O.	III. Deel. *Tab.* XI. *Fig.* 1 - 4.
	36.	
Eiken - Linden- Kerſe - Perſike - en Kwetzen boomen - bladeren.	De bleekgroene *Rups* , met vier geele en ééne witte linie , van welke het laatſte lid meer verhoogd is, dan de overigen , uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders; *Linn.* O.	III. Deel. *Tab.* XL. *Fig.* 1 - 5.

MAI.

BESCHRYVINGE.

37.

Voedzel.

Zy geneert zich met de bladen van de Wollige-Wilgen, Jonge-Eiken, Eſſen en Beukeboomen; mitsgaders met die van Roozen, Aardbeziën, Brandnetels enz.

De zwarte *Rups*, met de drievoudige geele boordzels, DOMINULA, *Linn.* p. 834. ſp. 90. uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders.

Röſel.

III. Deel. *Tab.* XLVII. *Fig.* 1-5.

38.

In de aarde, aan vermolmde Espen, Olm, en Denneboomen; ook aan de Wortels van Gras-Zuuring, Smalle Weegbree, enz.

De bleek-groenachtige blinkende *Rups*, met den zwarten kop, zwarte Naſchuivers en Wratten*, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders. *Linn.* O.

III. Deel. *Tab.* XLVIII. *Fig.* 4.

39.

Kruisbeziën-bladeren.

De zwarte *Rups*, met den bruinen kop, en ter zyde een

III. Deel. *Tab.* L. *Fig.* 1-4.

* Dewyl ik den Vlinder van deze Rups bezit, zo zal ik denzelven, benevens de Pop, in myne *Byvoegzelen*, afgebeeld mededeelen.

MAI.

Voedzel.	Beschryvinge.	*Röſel.*
	een gecoleurden helderen ſtreep uit de 2de Claſſe der Nachtvlinders. Satallitia, *Linn.* p. 855. ſp. 176.	
	40.	
De tedere wortelen van gras, en andere Kruiden onder de aarde.	De onaanzienlyke bruine *Aard-Rups*, uit de 2de Claſſe der Nachtvlinders; by den *Natur-Forſcher*, IX. Deel pag. 131. Brunea.	III. Deel. *Tab.* LVIII. *Fig.* 6. en *Kleemanns*, Byv. I. *Tab.* XVII *Fig.* A. B.
	41.	
Lindeboomen &c.	De kleine roodachtig graauwe *Rups*, met den geelen kop en diergelyke bezooming ter zyden, benevens andere zwarte vercierſelen. Den Vlinder van deze Rups heeft *Röſel* niet beſchreeven.	III. Deel. *Tab.* LVIII. *Fig.* 7.

MAI.

BESCHRYVINGE.

Voedzel.	42.	*Röſel.*
Eiken - Beuken - en Espenbladeren.	De groote graauwe *Rups*, met den breeden zwart bezoomden blaauwachtig - graauwen Ruggeſtreep, en roodbruine hairige vlakken en punten, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders; *Linn.* O.	III. Deel. *Tab.* LXXI. *Fig. a.* 1 - 3. en IV. Deel *Tab.* XXXIV. *Fig. a. b.*
	43.	
Standelkruid, groot Breuk - of Wondkruid, groeiende op ſteenachtige plaatzen.	De Fluweelzwarte *Rups**, met kleine Oranjeroode vlakken, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders. APOLLO, *Linnæus* p. 754. ſp. 50.	IV. Deel. *Tab.* IV. *Fig* 1, 2. en [illegible]. Deel. *Tab.* XLV. *Fig.* 1, 2.
	44.	
Eikenbladeren, enz.	De gladde groene *Rups*, met de klei-	IV. Deel. *Tab.* X. *Fig.* 1 - 5.

* De ſchoone Vlinder van deze Rups vliegt maar eenmaal des jaars, en wel in de Zomermaanden.

MAI.

Voedzel.	Beschryvinge.	*Röſel.*
	kleine Rugwratten uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders Bicelorana, *Füeſslin* Verz. der Zwitzerſche Inſecten, p. 41. Numb. 798.	
	45.	
Averone, ſmalle Weegbree.	De ſchoon getekende en met oranjegeele en witte Doornen bezette *Rups*, uit de eerſte Claſſe der Dagvlinders; Cinxia, *Linn.* p. 784. ſp. 205. de *Gebandeerde Mantel.*	IV. Deel. *Tab.* XIII. *Fig.* 1, 2. *Tab.* XXIX. *Fig.* A. B. C. D.
	46.	
Muisooren, enz.	De kleine koolzwarte *Doornrups*, met eene rei witte punten aan weerszyde, uit de Eerſte Claſſe der Dagvlin-	IV. Deel. *Tab.* XIII. *Fig.* 4, 5. en *Tab.* XVIII. *Fig.* 6.

MAI.

Voedzel.	Beschryvinge.	*Röſel.*
	vlinders; Pilosella, by *Linnæus*, zynde eene verſcheidenheid van de Cinxia.	
	47.	
Wolfsmelk, Ojevaarsbek,	De op de Wolfsmelk leevende *Ringrups*, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders. Castrensis, *Linn.* p. 818. ſp. 36. de *Duin-Ringrups*.	IV. Deel. *Tab.* XIV. *Fig.* 1-6.
	48.	
Eikenloof, enz.	De wit graauwe en bruin geſtreepte *Rups*, met vleeſchige ſpitzen en wratten vercierd, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders; Sponsa, *Linn.* p. 831. ſp. 78. het *Carmynroode Weeskind*.	IV. Deel. *Tab.* XIX. *Fig.* 1-4.

MAI.

BESCHRYVINGE.

49.

Voedzel. — De kleine, zwartbruine en korthairige *Rups*, met den rosgeelen Ruggeſtreep, en eene witte bezooming ter weder zyde; uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders. GRAMMICA, *Linn.* p. 331. ſp. 75. — *Röſel.* IV. Deel. *Tab.* XXI. *Fig. a-d.*

Averone, Eikenloof, en ſmalle Weegbree.

50.

De Eenzaame koolzwarte *Doornrups*, met tegelroode zydevlakken, uit de eerſte Claſſe der Dagvlinders; AGLAJA, *Linn.* p. 785. ſp. 211. de groote *Paerlemoer Kapel.* — IV. Deel. *Tab.* XXV. *Fig.* 1-4.

Waarſchynlyk zyn de groene bladeren van de roode Nachtviolen haar voedzel.

51.

De zeldzaame bruinhairige *Beeren-* — IV. Deel. *Tab.* XXIX. *Fig.* 1-4. en *Tab.* XXVIII. *Fig.* 2.

Tuin-Salade, Duizendblad, enz.

MAI.

BESCHRYVINGE.

Voedzel.		*Röſel.*
	renrups, met den rooden kop en pooten, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders; VILLICA, *Linn.* p. 810. ſp 41.	
	52.	
Alle ſoorten van Eerenprys, Muisooren, enz.	De kleine zwarte met veele witte punten beſprengkelde *Doornrups*, met den rooden kop en pooten, uit de eerſte Claſſe der Dagvlinders; CINXIA *Linn.* p. 784. ſp. 205. Zie ook *Mullers* Faun: Fridr. p. 35. No. 324.	IV. Deel. *Tab.* XXIX. *Fig.* A. B. C. D. als mede *Tab.* XIII. *Fig.* 4-7.
	53.	
Raatelaar en Abeelen boomen	De byzonder ſchoon getekende *Doornrups*, uit de eerſte Claſſe der Dag-	IV. Deel. *Tab.* XXXI. *Fig.* 1-5. en III. Deel. *Tab.* XXXIII. *Fig.* 1, 2.

MAI.

Voedzel.	BESCHRYVINGE.	*Röſel.*
	Dagvlinders. POPULI, *Linn.* p. 776. ſp. 162. de *Nimweegſche kapel.*	
	54.	
Hondskerſen.	De gepukkelde groene *Rups*, met een oranjegeelen ſtaarthoren op het laatſte Lid en twee witte zyde liniën, uit de eerſte Claſſe der Nachtvlinders. SPHINX FUCIFORMIS, *Linn.* p. 803. ſp. 28. 't *glazen Onruſtje.*	IVE. Deel. *Tab.* XXXIV. *Fig.* 1-4 en III. Deel *Tab.* XXXVIII. *Fig.* 2-3.
	55.	
Wolfsmelk, Kweekgras en Wilde Byvoet.	De met bruinachtig graauwe hairen bezette *Beerenrups*, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders. HEBE, *Linn.* p. 820. ſp 40.	IV. Deel. *Tab.* XXV. *Fig.* 1. en 2. Zie ook *Kleemanns* byvoegzels; *Tab.* XIII. *Fig.* 1 3.

MAI.

Voedzel.	Beschryvinge.	*Röfel.*
	56.	
Gemeene Klaver.	De bruinachtig-geele, bruin geſtreepte gladde *Spanrups*, met twaalf pooten, uit de derde Claſſe der Nachtvlinders; Glyphica, *Linn.* p. 838. ſp. 105.	*Kleemanns* Byv. I. *Tab.* XXV. *Fig.* 1-8.
	57.	
Kwetzenboomen, enz.	De gladde roodachtig-bruingeel gevlakte en zwart geſtippelde *Spanrups*, met 10 pooten, uit de derde Claſſe der Nachtvlinders; *Linn.* O.	*Kleemanns* Byv. I. *Tab.* XXVI. *Fig.* 1-5.
	58.	
Kwetzen en andere Ooftboomen, Iepen, Ahorn, Eiken, Berken, Linden, Roozeboomen, enz.	De ſchadelyke gezellige gladde groene met witte ſtreepen vercierde en met 10 pooten voorziene *Spanrups*,	*Kleemanns* Byv. I. *Tab.* XXXI. *Fig.* 1-12.

MAI.

Voedzel.	BESCHRYVINGE.	*Röſel.*
	rups, uit de derde Claſſe der Nachtvlinders; BRUMATA, *Linn.* p. 874. No. 281. het *Wintermeetertje.*	
	59.	
Brandenetels, enz.	De groene heldergeſtreepte, met tedere hairen en 14 pooten bezette ſpringende *Spanrups*, uit de derde Claſſe der Nachtvlinders; *Linn.* O.	*Kleemanns* Byv. I. *Tab.* XXXI. *Fig.* 1-10.
	60.	
Appelboomen, Wollewilgen, enz.	De grootkoppige, breedlyvige graauwachtig bruine en witgevlakte hairige *Boomrups*, met eene donkerblaauwe ruggevlak en blaauwe knoppen vercierd, uit de tweede Claſſe derNachtvlinders.	*Kleemanns* Byv. I. *Tab.* XXXIII. *Fig.* 1-6.

MON-

MAI.

BESCHRYVINGE.

Voedzel.		*Röſel.*
	MONACHA, *Linn.* p. 821. ſp. 43. de *Non.*	
	61.	
Pruimenboomen, enz.	De eenzaame gladde donker bruinachtig graauwe dungeſtreepte *Spanrups*, met 10 pooten en twee bultige Leden, uit de derde Claſſe der Nachtvlinders; *Linn.* O.	*Kleemanns* Byv. I. *Tab.* XXXV. *Fig.* A-D.
	62.	
Sanikkel, Eikebladeren, Verkensgras, enz.	De zwartkoppige, heldergeel geborduurde *Rups*, die met een oranjegeelen Ruggeſtreep, benevens diergelyke ſtyfhairige knopjes vercierd is, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders; HERA, *Linn.* p. 834. ſp. 91. de *Spaanſche Vlag.*	*Kleemanns* Byv. I. *Tab.* XLI. *Fig.* 1-5.

JUNY.

Voedzel.	BESCHRYVINGE.	*Röſel.*
	63.	
Sleeſtruiken, Pruimen- en Kwetzenboomen	Het kleine groene bultige *Rupsje*, uit de tweede Claſſe der Dagvlinders. PRUNI, *Linn.* p. 788. ſp. 221.	I. Deel. Dagvl. 2de Claſſe, *Tab.* VII. *Fig.* 1-4.
	64.	
Wilde Kool, Moſtaart, Bergkors, Tasjeskruid enz.	De eenzaame dof-groene *Rups*, des Dagvlinders van de tweede Claſſe, CARDAMINES AURORA, *Linn.* p. 761. ſp. 85. *Pieterſeliebeesje.*	I. Deel. Dagvl. 2de Claſſe, *Tab.* VIII. *Fig.* 1-8.
	65.	
Eikenbladeren.	Het kleine dikke en rond verheven roozenkoleurige *Schild-Rupsje*, van de tweede Claſſe der Dagvlinders; QUERCUS, *Linn.* p. 788. ſp. 222. het *Schildpadrupsje van den Eyk.*	I. Deel. Dagvl. 2de Claſſe, *Tab.* IX. *Fig.* 1-5.

JUNY.

Voedzel.	BESCHRYVINGE.	*Röſel.*
	66.	
Malva.	De zwartkoppige, vaalbruine *Rups*, met den geel gevlakten hals der Dagvlinders tweede Claſſe. MALUA, *Linn.* p. 795. ſp. 267.	I. Deel. Dagvl. 2de Claſſe, *Tab.* X. *Fig.* 6, 7.
	67.	
Sleeſtruiken, Willige, Pruimen- en Kerſen, Kwetzen, Appel en Peereboomen	De ſchoone groote groene *Rups**, met ronde verheven, roode en geele knoppen, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders. PAVONIA MINOR, *Linn.* p. 810. ſp. 7. de *kleine Nachtpaauwen oog.*	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* IV. *Fig.* 1-7. en *Tab.* V. *Fig.* 8-14

* Zy is ook nog in *Auguſtus* te vinden, en de uit haar voortkomende Vlinder blyft zomtyds twee Winters over in zyne Poppenſchale, eer hy voor den dag komt. In *Stiermarken* is 'er eene ſoort, waar van het Mannetje en Wyfje, beiden, aan het Wyfje van deze ſoort volkomen gelyken; die uit eene zwarte, eveneens getekende en met knoppen voorziene Rups ontſtaan zou.

JUNY.

BESCHRYVINGE.

Voedzel.	68.	*Röſel.*
Alle Ooft-en andere Boombladeren.	De ſchadelyke, gezellige, geſtreepte *Ringrups**, van de tweede Claſſe der Nachtvlinders. NEUSTRIA, *Linn.* p. 118. ſp. 35. de *Ring-Rups of Blaauwkop.*	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* VI *Fig.* 1-7.
	69.	
Hagedoorn, Perſik-en Appelboomen.	De kleiner bontverwige beknopte *Rups*, des Nachtvlinders tweede Claſſe. PSI, *Linn.* p. 846. ſp. 135. de *Piekenier.*	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* VIII. *Fig.* 1-5.
	70.	
Sleeſtruiken, Pruime-en Kwetzenboomen.	De gladde bleekgroene *Pyramiderups*, van de tweede Claſſe der Nacht-	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* XI. *Fig.* 1-6.

* Zy komt reeds in *April* uit overwinterde Eieren voort, en word tot in *July* gevonden.

JUNY.

Voedzel.	BESCHRYVINGE.	*Röſel.*
	Nachtvlinders; PYRAMIDEA, *Linn.* p. 856. ſp. 181. *Pyramiderups* de MEUDONET, *l'Admiral*, *pl.* 11.	
	71.	
Wilde en Tuin-Ridderſpooren.	De Violet-blaauwe, geel geſtreepte en zwart beſpikkelde *Rups*, van de tweede Claſſe der Nachtvlinders. DELPHINII, *Linn.* p. 857. ſp. 188. *'t Ridderſpoortje.*	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* XII. *Fig.* 1-6.
	72.	
Allerhande Ooft-boomen, Sleeſtruiken, enz.	De dikke zeegroene, geel geſtreepte en zwartgeſpikkelde *Rups*, der Nachtvlinders tweede Claſſe. CÆRULEOCEPHALA, *Linn.* p. 826. ſp. 59 *Zonder Zomer.*	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* XVI. *Fig.* 1-5.

JUNY.

BESCHRYVINGE.

Voedzel.	73.	*Röſel.*
Smalbladige Wilgen, Linde- Espen - Poplier- en Wollewilge- bladeren, enz.	De ſchoone diklyvige groene *Rups*, met een dubbelen ſtaart, tot de tweede Claſſe der Nachtvlinders behoorende. VINULA, *Linn.* p. 850. ſp. 153. de *groote Tweeſtaart*, *Hermelynvlinder.*	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* XIX. *Fig.* 1.-11
Wolle of Torſekruid.	74. De groenachtig witte, zwartgevlakte *Rups*, des Nachtvlinders der tweede Claſſe. VERBASCI, *Linn.* p. 880. ſp. 153. de *Wollekruids - Uil.*	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe *Tab.* XXIII. *Fig.* 1-5.
Melde, Salade, Erwtenloof, Melkdiſtel, Rooze- en Pruimenbladeren, Kartoffels of Aardappelen.	75. De groote, gladde, groene en op verſcheiden wyze ge-	I. Deel. *Tab.* XXIV. *Fig.* 1-5.

JUNY.

Voedzel.	BESCHRYVINGE.	*Röſel.*
	getekende *Rups*, vande tweede Claſſe der Nachtvlinders. EXSOLETA. *Linn.* p. 849. ſp, 151. de *Roetvlakkige.*	
	76.	
Aan de Stammen van Appelboomen, Hagedoorn en Kwetzenboomen.	De gladde helder-graauwe en bruin geruite *Boomrups* uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders. OLERACEA, *Linn.* 853. ſp. 171.	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* XXXII. *Fig.* 1-6
	77.	
Gemeen Gras, Kweepeeren - en Wolle - Wilgen - bladeren, Appel- Kwetzen - Framboizen - en Sleebladeren; ook van Pynboomen enz.	De kleiner en ranker bruingeele Vilthairige *Kweepeeren - Rups*, des Nachtvlinders der tweede Claſſe. DUMETI, *Linn.* p. 815. ſp. 26. de *Gras - Jaager.*	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* XXXV. *b. Fig.* 1 - 3. ook *Tab.* XXXV. *a. Fig.* 4 - 6.

JUNY.

BESCHRYVINGE.

Voedzel.	78.	*Röſel.*
Wolle en ronde ruige Wilgen, Eiken-Kwetzen-Pruimenbladeren Hagedoorn- en Roozeſtruiken, enz.	De geele *Borſtelrups**, van de tweede Claſſe der Nachtvlinders. PUDIBUNDA, *Linn.* p. 824. ſp. 54. de *geele Antiek.*	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* XXXVIII. *Fig.* 1-9
	79.	
Pruimen-Kwetzen-Kerſen, Peeren-Perſiken-Eiken-Elzeboomen, Wolle-en Kattenhout, Haagedoorn, Sleeſtruiken, enz.	De met roode knopjes vercierde graauwe *Borſtelrups*†, des Nachtvlinders tweede Claſſe, ANTIQUA, *Linn.* p. 825. ſp. 56. de *kleine Antiek.*	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* XXXIX. *Fig.* 1-5
	80.	
Kraak- of Heidebezien, Berken, Framboizen, Braambeziën, en jong Eikenloof.	De ſchoone oranjegeel geſtreepte *Borſtelrups*§, des Nacht-	I Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* XL. *Fig.* 1-10.

* Zy wordt ook in *September* byna geheel zwart gevonden. KL.

†. Men vindt ze ook volwaſſen in verſcheiden andere maanden, als in *July*, *Auguſtus*, *September*. KL.

§. Ook is ze in *Mai* en andere laater maanden te vinden. KL.

JUNY.

BESCHRYVINGE.

Voedzel. | Nachtvlinders der tweede Claſſe. GONOSTICHMA, *Linn.* p. 876. ſp. 57. | *Röſel.*

31.

De bladeren van Kerſen, Kwetzen, Hazelnooteboomen, enz.

De geelachtig-groene, met drie geele ſtreepen vercierde gladde *Rups* uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders. By *Fabricius* in Syſt. Entomolog. p. 600. No. 42. CERASI, de *Kerſenuil.* Doch het moet, volgens de Aanmerkingen van den Heer *Rottemburg*, over de Vlinder-Tafels van Hoefnagel, *Incerta* zyn. Zie Nat. Forſch. 9de ſtuk pag. 119.

I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* LIII. *Fig.* 1-4.

JUNY.

Voedzel.	BESCHRYVINGE.	*Röſel.*
	82.	
Kerſeboom-bladeren.	De geſtippelde blaauwachtig groene *Rups* *, met den bleekgeelen zydeſtreep, des Nachtvlinders der tweede Claſſe, *Linn.* O.	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* LIV. *Fig.* 5.
	83.	
Kruisbeziën, Nipte of Kattekruit, Akeley, Bernagie, Zuuring; Cikorey, enz.	De ranke, gladde, grasgroene *Rups*, met den geelen zydeſtreep, des Nachtvlinders der tweede Claſſe. *Linn.* O.	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* LV. *Fig.* 1-3.
	84.	
Wollekruid met witte bloemen.	De aardbruine *Rups*, met heldere zydeſtreepen, des Nachtvlinders der tweede Claſſe, Ty-	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* LVI. *Fig.* 1-5.

PI-

* Ik hebbe dezelve reets in *Mai* gevonden.

JUNY.

BESCHRYVINGE.

Voedzel.		*Röſel.*
	PICA, *Linn.* p. 857. ſp. 186.	
	85.	
Honds-of Kwekgras.	De dikke, helder-geele en zwart gevlakte *Rups*, van de tweede Claſſe der Nachtvlinders. SPHINX, FILIPENDULA, *Linn.* p. 805 ſp. 34. 't *groen glanzige rood gevlakte Duimiltje.*	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* LVII. *Fig.* 1-6.
	86.	
Pyn of Sparreboomen, enz.	De groote *Pynboom-Rups*, des Nachtvlinders der tweede Claſſe, PINI, *Linn.* p. 814. ſp. 24. de *Band-Uil van de Sparre boomen.*	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* LIX. *Fig.* 1-6.
	87.	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* LX. *Fig.* 1-6. en III. Deel. *Tab.* LXXI. *Fig. a.* 7. *a.* 8. *a.* 9.
Appel, Linde, Eikenboomen, enz.	De Vilthairige, graauwe *Rups*, met brui-	

JUNY.

Voedzel.	BESCHRYVINGE.	*Röfel.*
	bruine vlakken en oranjegeele punten, des Nachtvlinders dertweede Classe, POPULI, *Linn.* p. 818. sp. 34	
	88.	
Malva-bladeren; enz.	De bleekgroene *Spanrups*, uit de derde Classe der Nachtvlinders. FASCIARIA, *Linn.* p. 862. sp. 216. de *Gebandeerde.* En in de *Entom-Carn.* van *Scopolus* p. 534 CERVINALIS.	I. Deel. Nachtvl. 3de Classe, *Tab.* III. *Fig.* 1-3.
	89.	
Lindeboomen, Wollewilgen, Sleedoorn, Hagedoorn, Beukloof, enz.	De violet zwarte *Rups*, met geelachtig roode hairborstels, des Nachtvlinders dertweede Classe. LANESTRIS, *Linn.* p. 815. sp. 28.	I. Deel. Nachtvl. 2de Classe, *Tab.* LXII. *Fig.* 1-5.

JUNY.

Voedzel.	BESCHRYVINGE.	*Röſel.*
	90.	
Kruis, en Aalbeziën.	De blaauwachtig groene, geel geſtreepte en zwartgepunčteerde *Spanrups**, des Nachtvlinders derde Claſſe. WAUARIA *Linn.* p. 863. ſp. 219. en volgens *Mullers Faun. Friedr.* p. 49. No. 434. VIDUARIA.	I. Deel. Nachtvl. 3de Claſſe, *Tab.* IV. *Fig.* 1-4.
	91.	
De bladeren van Sieringe, Appel, Pruim, en Peerenboomen; Akeley, Muisoor, Caprifolie.	De groote, bruine en donker geſtreepte *Spanrups*, uit de derde Claſſe der Nachtvlinders. SAMBUCARIA, *Linn.* p. 860. ſp. 127. de *Punt-Kapel.*	I. Deel. Nachtvl. 3de Claſſe, *Tab.* VI. *Fig.* 1-5.

* Ik heb ze ook reets in *Mai* volwaſſen gevonden.

JUNY.

BESCHRYVINGE.

92.

Voedzel. — Het geelachtig groene *Spanrupsje* met den rooden Ruggeſtreep, des Nachtvlinders derde Claſſe. SUCCENTURIATA, *Linn.* p. 872. ſp. 267. — *Röſel.* I. Deel. Nachtvl. 3de Claſſe, *Tab.* VIII. *Fig.* 1-2.

Pruimenbladeren, enz.

93.

Het dikker groene *Spanrupsje*, met den rooden Ruggeſtreep, uit de derde Claſſe der Nachtvlinders. *Linn.*, O. 23 N. 29 — I. Deel. Nachtvl. 3de Claſſe, *Tab.* VIII. *Fig.* 1-3.

Appelboomen.

94.

De dikke byzonder ſchoone *Spanrups*, met twee gemshoornachtige haaken, en andere op den rugſtaande punten, der Nachtvlinders derde Claſſe — I. Deel. Nachtvl. 3de Claſſe, *Tab.* X. *Fig.* 1-7.

Syringebladeren.

JUNY.

Voedzel.	BESCHRYVINGE.	*Röſel.*
	ſe, SYRINGARIÆ, *Linn.*p.860.ſp.230	
	95.	
Anjelierbladeren.	De buigzaame *Spanrups*, met verſcheiden ſchubachtige vlakken en punten vercierd, des Nachtvlinders 3deClaſſe,*Linn.*O.	I. Deel. Nachtvl. 3de Claſſe, *Tab.* XI. *Fig.* 1-3.
	96.	
Pynboombladen, gemeene Brem.	De ſchoone breedlyvige *Spanrups*, met den buitengemeenen kop, uit de derde Claſſe der Nachtvlinders. PAPILIONARIA, *Linn.* p. 864. ſp. 225.	I. Deel. Nachtvl. 3de Claſſe, *Tab.* XII. *Fig.* 1-3.
	97.	
Wilde Jasmyn, Blaauwe beſſen, Eikenloof, enz.	Het kleine zeer dunne en bruingeſchubde *Spanrupsje*,	I. Deel. Nachtvl. 3de Claſſe, *Tab.* XIII. *Fig.* 1-4.

JUNY.

BESCHRYVINGE.

Voedzel.		*Röſel.*
	je, van de derde Claſſe der Nachtvlinders. VIRIDATA, *Linn.* p. 865. ſp. 230. het *Groentje.* en by *Fabricius*, S. E. p. 620. No. 3. VERNARIA, de *Lentevogel*, doch in *Mullers Faun. Friedr.* p. 51. No. 454. STRIGATA.	
	98.	
Eikenbladeren.	De Groene *Bladroller*, met kleine zwarte punten of ſtippen, des Nachtvlinders der vierde Claſſe. TORTRIX VIRIDANA, *Linn.* p. 875. ſp. 286. de *Groene Bladroller.*	I. Deel. Nachtvl. 4de Claſſe, *Tab.* I. *Fig.* 1-6.
	99.	
De bladeren van Kerſen- en Eikenboomen.	De zwarte *Bladroller*, met witte punten, uit de vier-	I. Deel. Nachtvl. 4de Claſſe, *Tab.* II. *Fig.* 1-4.

JUNY.

Voedzel.	BESCHRYVINGE.	*Röſel.*
	vierde Claſſe der Nachtvlinders. ROSANA, *Linn.* p. 876. ſp. 293.	
	100.	
Naar gedachten Sleeſtruikenbladeren.	Het kleine, dikke, bleekgroene *Rupsje*, met bruine punten en heldere ſtreepen, des Nachtvlinders der vierde Claſſe. ALUCITA PENTADACTYLA, *Linn.* p. 900. ſp. 459. het *Vyfvederige Penuiltje.*	I. Deel. Nachtvl. 4de Claſſe, *Tab.* V. *Fig.* 1-3.
	101.	
Bladeren van de Hop.	Het groene *Springrupsje*, van de vierde Claſſe der Nachtvlinders. PYRALIS ROSTRALIS, *Linn.* p. 881. ſp. 332.	I. Deel. Nachtvl. 4de Claſſe, *Tab.* VI. *Fig.* 1-5.

JUNY.

	Beschryvinge.	
	102.	
Voedzel.	De zwarte en met witte punten getekende *Bladroller*, uit de vierde Classe der Nachtvlinders. Salicella, *Linn.* p. 887. sp. 367.	*Rösel.* I. Deel. Nachtvl. 4de Classe, *Tab.* IX. *Fig.* 1-4.
Wilgebladeren, enz.		
	103.	
Appelboomen, enz.	Het kleine, bruine, hairige *Rupsje*, met witte Schilden, des Nachtvlinders der vierde Classe. Cucullatela, *Linn.* p. 889. sp. 376.	I. Deel. Nachtvl. 4de Classe, *Tab.* XI. *Fig.* 1-6.
	104.	
Appel- en Peerenboomen.	Het kleine *Appel*- en *Peerenboom-Rupsje*, des Nachtvlinders der vierde Classe. Pomonella, *Linn.* p. 892. sp. 401.	I. Deel. Nachtvl. 4de Classe, *Tab.* XIII. *Fig.* 1 5.

JUNY.

BESCHRYVINGE.

105.

Voedzel.

Jasmyn, Hennip, Wilgen, Wynruite, Aardappelen of Kartoffels, geele Raapen, *Liguſter*, Meekrap, Hondsbeziënſtruiken, Kuiſchboom, Brandenetelsenz.

De ongemeen groote, met geel en blaauw, ſchoon vercierde *Rups**, uit de eerſte Claſſe der Nachtvlinders. SPHINX ATROPOS, *Linn.* p. 799. ſp. 9. het *Doodshoofd.*

Röſel.

III. Deel. *Tab.* I. *Fig.* 1-4.

106.

Liguſtrum, Wilge-Berkebladeren, Syringe en Spaanſche Vlier.

De ſchoonegroene *Rups* met een Hoorn†, en zeven paar ſchuinſe zydeſtreepen, die half

III. Deel. *Tab.* V. *Fig.* 1-6.

* Deze anders zo zeldzaame Rups heeft zich thans op eenige plaatzen van Duitſchland zo Landeigen gemaakt, dat, volgens de verzekering van myn waarden en geleerden Vriend, den, door zyne voortreffelyke Schriften en overzetting van de Baron *Degeers* Inſecten Werk, beroemden Heer Paſtor *Goeze* te Quedlinburg, de Boeren by *Halle*, in den Herfſt des jaars 1776. gantſche Hengelmandjes vol Doodshoofdsrupſen op de Aardappelen-Akkers verzameld, te koop gebragt, en 'er veel gelds voor gemaakt hebben. Zy is ook in den Herfſt te vinden.

K.L.

† Ook in laater maanden vertoont zich deze ſchoone Rups, gelyk ze dan in onze geweſten in den jaare 1776. van *July* af, tot in 't laatſte van *October*, by menigte op de Syringe te vinden was.

K.L.

JUNY.

Voedzel.	BESCHRYVINGE.	*Röſel.*
	half purperverwig en half wit zyn; uit de eerſte Claſſe der Nachtvlinders. SPHINX LIGUSTRIS. *Linn.* p. 799. ſp. 8. de *Liguſter-Uil.*	
	107.	
Kerſe, Lindebladeren, Hagedoorn, Perſiken, Pruimen, Eiken, Slee, Wolle, en Kattenhoutbladeren.	Het kleine *Borſtelrupsje*, des Nachtvlinders der tweede Claſſe. ANTIQUA, *Linn.* p. 825. ſp. 56. de *Kleine Antiek.*	III. Deel. *Tab.* XIII. *Fig.* 1-4.
	108.	
Kerſen, Kwetzen, Eiken, Espen, Perſiken, Peerenboombladeren, ook Wollewilgen-en Roozenbladeren.	De roodbruine *Spanrups**, uit de derde Claſſe der Nachtvlinders. BRUMATA, *Linn.* p. 874. ſp. 281. 't *Wintermeetertje.*	III. Deel. *Tab.* XIV. *Fig.* 1-5. ook II. Deel. *Tab.* XI. *Fig.* 6.

* Men vindze ook reeds volwaſſen in *Mai.*

JUNY.

BESCHRYVINGE.

109.

Voedzel.

Kruisbeziën, enz.

De zwarte *Rups*, met den bruinen kop, en eene afgezette heldere zyde linie, desNachtvlinders dertweede Classe. SATELLITA, *Linn.* p.855.sp.156

Röfel.

III. Deel. *Tab.*L. *Fig.* 1-4.

110.

De jonge Wortels van Gras en andere Kruiden in de verſche aarde.

De onaanzienlyke bruine *Aardrups*, uit de tweede Classe der Nachtvlinders. By *Walchs Natur - Forſcher*, BRUNEA, in 't 9 ſtuk, *pag.* 131.

III. Deel. *Tab.* LXVIII. *Fig.* 6. *Kleemanns* Byv. I. *Tab.* XVII. *Fig.* A. B.

111.

Honds-of Kwekgras in de Weiden.

De blinkende gladde, bruine *Rups*, met den bleeken kop, en vyf insgelyks bleeke bandverwige ſtreepen desNachtvlinders dertweede Classe. *Linn.* O.

III. Deel. *Tab.* LXVIII. *Fig.* 8. *Kleemanns* Byv. I. *Tab.* XXIX. *Fig.* 1-9.

JUNY.

BESCHRYVINGE.

Voedzel.	112.	*Röſel.*
Hondskerſeſtruiken, met roode vrugten, Caprifoelie, in dalen en ſchaduwachtige plaatſen.	De ongemeen ſchoone, groene en eenzaame *Doornrups*, met roode doornachtige ſteekels, des Nachtvlinders der eerſte Claſſe. SYBILLA. *Linn.* p. 781. ſp. 186.	III. Deel. *Tab.* LXX. *Fig.* 1-3. ook *Tab.* XXXIII *Fig.* 3, 4.
	113.	
Berken - Beuken - en Eikenbladeren, ook Wollewilgen.	De kleine bleekgroene *Rups**, met hoog karmynroode Doornſpitzen, des Nachtvlinders dertweede Claſſe. TAU, *Linn.* p. 811. ſp. 8.	III. Deel. *Tab.* LXX *Fig.* 4. *a.* en 5. *a.* ook *Tab* LXVIII. *Fig.* 1-4 en IV. Deel. *Tab.* VII. *Fig.* 3-4.
	114.	
Gemeene Klaver, enz.	De kleine geelachtig-groene *Rups*, met	III. Deel. *Tab.* LXX. *Fig. b. b.* en *Tab.* XXXVII. *Fig.* 1, 2.

* Jong zynde verſchynt deze merkwaardige Rups met Doornen; maar by verdere verandering van huid en toeneemenden wasdom verlieſt zy dezelven. In de maanden *July* en *Auguſtus* is ze volwaſſen te vinden.

JUNY.

BESCHRYVINGE.

Voedzel. *Röſel.*

met den vleeſchverwigen ronden kop en twee ſpitzen van die koleur op het laatſte lid; waarſchynlyk uit de eerſte Claſſe der Dagvlinders. GALATHEA, *Linn.* p. 772. ſp. 174. de *Witte Argus.*

115.

Eikenbladeren. en des noods ook Beukenloof.

De groote graauwe *Rups**, met den breeden, zwart bezoomden blaauwgraauwen Ruggeſtreep, en roodbruine hairige vlakken en punten, des Nachtvlinders der tweede Claſſe *Linn.* O.

III. Deel. *Tab.* LXXI. *Fig. a.* 1. *a.* 2. *a.* 3. en IV. Deel. *Tab.* XXXIV. *Fig. a. b.*

* Ook is ze in de maand *Mai* reets op de Eikenboomen te vinden.

JUNY.

BESCHRYVINGE.

Voedzel.	116.	*Röfel.*
Pruimen, Kwetzen en Wilgebladeren.	De gladde groene met vyf witte liniën getekende *Rups**, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders. *Linn.* O.	III. Deel. *Tab.* LXXI. *Fig. b.* 4. *b.* 5. *b.* 6.
	117.	
Zuuring, doch liever Grasſcheutjes.	De gladde, helderbleeke, bruinachtige *Rups*, met een graauw-bruinen zwart getekenden kop, bruin-graauwe rugge- en zyde liniën, des Nachtvlinders der tweede Claſſe. *Linn.* O.	III. Deel. *Tab.* LXXI. *Fig. c.* 11. en *e.* 12. *Kleemanns* Byv. I. *Tab.* XXIV. *Fig.* 1-6.
	118.	
tandelkruit, groot Breuk, of Wondkruit, op ſteenachtige plaatzen groiende.	De fluweelzwarte *Rups*, met kleine oranjeroode vlakken, uit de twee-	IV. Deel. *Tab.* IV. *Fig.* 1-2. en III. Deel. *Tab.* XLV. *Fig.* 1-2.

* Deze wordt insgelyks in de maand *Mai* al volwaſſen gevonden.

JUNY.

BESCHRYVINGE.

Voedzel.		*Rôsel.*
	tweede Classe der Dagvlinders. APOLLO, *Linn.* p. 754. sp. 50.	
	119.	
Averone, Smalle Weegbree enz.	De schoon getekende en met oranjegeele en witte Doornen bezette *Rups*, van de eerste Classe der Dagvlinders. CINXIA, *Linn.* p. 784. sp. 205. de *Gebandeerde Mantel.*	IV. Deel. *Tab.* XIII. *Fig.* 1, 2, 3, 6, 7. en *Tab.* XXIX. *Fig.* A-D
	120.	
Muisoor, Espe of Raatelaar.	De kleine koolzwarte *Doornrups*, met eene rei witte stippen aan ieder zyde, uit de eerste Classe der Dagvlinders. By *Walchs Natur-Forscher*, 6de stuk. p. 5. PILOSELLA, eene soort van de *Cinxia*	IV. Deel. *Tab.* XIII. *Fig.* 4-5. en *Tab.* XVIII. *Fig.* 4.

JUNY.

Beschryvinge.

Voedzel.		*Röſel.*
	121.	
Wolfsmelk, Ojevaarsbek enz.	De op het Wolfsmelkkruidzichonthoudende *Ringrups**, des Nachtvlinders dertweede Claſſe. Castrensis, *Linn.* p. 818. ſp. 36. de *Duin-Ringrups.*	IV. Deel. *Tab.* XIV. *Fig.* 1-6.
	122.	
Eikenloof.	De ligtgraauwe en bruingevlakte, met vleeſige punten en wratten vercierde *Rups*, des Nachtvlinders der tweede Claſſe. Sponsa, *Linn.* p. 841. ſp. 118. het *Karmoſyne Weeskind.*	IV. Deel. *Tab.* XIX. *Fig.* 1-4.
	123.	
Gras, ſmalle Weegbree, Zuuring, de bladeren van Aalbezien, enz.	De helder bruine gladde *Rups*†, met	IV. Deel. *Tab.* XXI. *Fig.* 1-3.

* Deze Rups is ook in *July* te vinden. Kl.

† Ook in *July* vindt men deze Rups nog. Kl.

JUNY.

Voedzel.	BESCHRYVINGE.	*Röſel.*
	met donkerbruine geſchubde dwarsvlakken en heldere afgebroken ſtreepen, des Nachtvlinders der tweede Claſſe. *Linn.* O.	
	124.	
Salade, ook de bladeren der Vioolen.	De kleine zwarte en ſteenroode *Beerenrups*, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders. PLANTAGINIS. *Linn.* p. 820. ſp. 42	IV. Deel. *Tab.* XXIV. *Fig.* 1-10.
	125.	
Vermoedelyk de bladeren der Vioolen, in de boſchen.	De eenzaame koolzwarte *Doornrups*, met ſteenroode zydevlakken, des Dagvlinders eerſte Claſſe. AGLAIA, *Linn.* p. 785. ſp. 211. de *groote Parlemoer-*	IV. Deel. *Tab.* XXV. *Fig.* 1-5.

JUNY.

BESCHRYVINGE.

Voedzel.		*Röſel.*
	Kapel. In *Füeſzlin* Verz. der Zwitzerſche Inſecten, p. 30 N. 587.	
	126.	
De bladeren van Vuilboom, en Weidoorn.	De dofgroene *Rups**, van den Vuilboom, des Dagvlinders tweede Claſſe. *Pap.* RHAMNI, *Linn.* p. 765. ſp. 106. de *Citroen of Boter Kapel.*	IV. Deel. *Tab.* XXVI. *Fig.* 1-5. en III. Deel. *Tab.* XLVI. *Fig.* 1-3.
	127.	
Tuin-Salade, Duizendblad enz.	De zeldzaame bruinhairige *Beerenrups*, met den rooden kop en pooten, des Nachtvlinders dertweede Claſſe. VILLICA, *Linn.* p. 820. ſp. 41. de *zwarte Beer* de *Roemvlak.*	IV. Deel. *Tab.* XXIX. *Fig.* 1-4. en *Tab.* XXVIII. *Fig.* 2.

* Deze Rups en haar Vlinder behooren tot die ſoort van Dagvlinders, die jaarlyks tweemaal te voorſchyn komen, en wier Poppen overwinteren. Hy vliegt terſtond met den aanvang der Lente, en dan weder van den Zomer tot in den Herfſt.

KL.

JUNY.

BESCHRYVINGE.

128.

Voedzel.		*Röſel.*
Wilgen, Eſſenbladeren, enz.	De byzonder gevormde, doſgroene gehoornde *Rups*, of het *Reebokje**, van de eerſte Claſſe der Dagvlinders. IRIS, *Linn.* p. 775. ſp. 161. de *Weerſchyn-Kapel.*	IV. Deel. *Tab.* XXXI. *Fig.* 6. en III. Deel. *Tab.* XLII. *Fig.* 1-4.

129.

Caprifoelie, Hondskerſen.	De ſagrynagtige groene *Rups*†, met een oranjegeelen ſtaarthoorn en twee witte zyde liniën, des Nachtvlinders der eerſte Claſſe. SPHINX FUCIFORMIS, *Linn.* p. 803. ſp. 28. *'t Glaazen Onrustje.*	IV. Deel. *Tab.* XXXIV. *Fig.* 1-4. en III. Deel. *Tab.* XXXVIII. *Fig.* 2, 3.

* Ook vindt men ze in *July*. KL.

† Deze wordt in *Auguſtus* nog gevonden. KL.

JUNY.

BESCHRYVINGE.

Voedzel.	130.	*Röſel.*
Tuin-Salade, Gras, klein Grind- of Scabioſen-kruid, ook ſmalle Weegbree.	De kleine, zeer ſnel loopende *Rups*, met bruinroode hairen, geelen ruggeſtreep, en zwarten als Koper blinkende kop, des Nachtvlinders der tweede Claſſe. *Phal. Bomb.* RUSSULA, *Linn.* p. 830. ſp. 713.	*Kleemanns* Byv. I. *Tab.* XX. *Fig.* 1-8.
	131.	
De bladeren van Tabak, van Cicory, van Perſikeboomen.	De eenzaame, gladde, effe groene *Rups*, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders. *Phal. Noct.* PLECTA, *Linn.* p. 851. ſp. 157. Zie *Füeſzlin* Verz. der Zwitzerſche Inſecten, p. 38. N. 734.	*Kleemanns* Byv. I. *Tab.* XXIII. *Fig.* 1-7.

JUNY.

BESCHRYVINGE.

132.

Voedzel.

Gemeene Klaver, enz.

De bruin geele, bruin geſtreepte, met 14 pooten voorziene gladde *Spanrups*, van de derde Claſſe der Nachtvlinders. *Phal. Noct.* GLYPHICA, *Linn.* p. 838. ſp. 105. Zie *Füeſzlin* Verz. der Zwitzerſche Inſecten, p. 37. N. 699.

Röſel.

Kleemanns Byv. I. *Tab.* XXV. *Fig.* 1-10.

133.

Muisooren, Rhynbloemen, ſmalle Weegbree Kruiskruid, op dorre Heiden, en wilde Ridderſpooren.

De ſnelloopende en zwarthairige *Beerenrups*, met den geel-rooden ruggeſtreep, des Nachtvlinders der tweede Claſſe. *Linn.* O.

Kleemanns Byv. I. *Tab.* XXX. *Fig* 1-5.

JUNY.

BESCHRYVINGE.

134.

Voedzel.

De bladeren van Appel- en Wollewilgenboomen, enz.

De grootkoppige, breedlyvige, graauwachtigbruin en witgestreepte, hairige *Boomrups*, die met een donkerblaauwen Ruggevlak en blaauwe knoppen vercierd is, uit de tweede Classe der Nachtvlinders. *Phal. Bomb.* MONACHA, *Linn.* p. 281. sp. 43. de *Non.*

Röſel.

Kleemanns Byv. I. *Tab.* XXXIII. *Fig.* 1-6.

135.

De bladeren van Moerelle, Berken, Linden, Kersen, Peeren- en Appelboomen

De groote bruinachtig graauwe gladde *Spanrups*, met smalle linien en vierkante vlakken vercierd, en met 10 pooten voorzien, uit de derde Classe der Nacht-

Kleemanns Byv. I. *Tab.* XXXIV. *Fig.* 1-7.

JUNY.

BESCHRYVINGE.

Voedzel.		*Röſel.*
	Nachtvlinders. ATOMARIA, *Linn.* p. 862. ſp. 214.	
	136.	
Het loof van Eiken, Linden- en andere boomen.	De groote, gladde, nu donkerroodbruine, dan roodachtig-graauwe *Spanrups*, die met veele ſmalle linien overtoogen, en met ettelyke reien ſchoone geele dwarsvlakken op den rug vercierd is, en 10 pooten heeft; van de derde Claſſe der Nachtvlinders. *Linn.* O.	*Kleemanns* Byv. I. *Tab.* XXXV. *Fig.* 1-5.
	137.	
Berkeboombladeren.	De halfſpannende, grasgroene, geel geſtreepte *Rups*, met ongelyke Buikpooten, des Nachtvlinders der tweede Claſſe. *Linn.* O.	*Kleemanns* Byv. I. *Tab.* XL. *Fig.* 1-4.

JULY.

BESCHRYVINGE.

138.

Voedzel.

Wildekool en Mosterd - Bergkers, Tasjeskruid enz.

De eenzaame dofgroene *Rups*, uit de tweede Classe der Dagvlinders. CARDAMINES, *Linn.* p. 761. sp. 85. het *Oranje Pieterselie Beestje.*

Rösel.

I. Deel. Dagvl. 2de Classe, *Tab.* VIII. *Fig.* 1-8.

139.

Eikenbladeren, enz.

Het kleine, dikke, roodverheven, roozenkoleurige *Schild-Rupsje*, uit de tweede Classe der Dagvlinders. QUERCUS, *Linn.* p. 788. sp. 222. het *Schildpadrupsje van den Eyk.*

I. Deel. Dagvl. 2de Classe, *Tab.* IX. *Fig.* 1-5.

140.

Linden - Berken - en Peerenboomen.

De groene blaauwstaartige *Rups*, met schuinse roode en geele streepen aande zyden, des Nacht-

I. Deel. Dagvl. 2de Classe, *Tab.* II. *Fig.* 1-7.

JULY.

Voedzel.	BESCHRYVINGE.	*Röſel.*
	Nachtvlinders der tweede Claſſe. TILIÆ, *Linn.* p. 797. ſp. 3. de *Lindrups.*	
	141.	
Wolfsmelk. Meekrap, enz.	De groote, ſchoone, op de Wolfsmelk aazende *Rups**, des Nachtvlinders der eerſte Claſſe.	I. Deel. Dagvl. 1ſte Claſſe, *Tab.* III. *Fig.* 1-5. en III. Deel. *Tab.* VI. *Fig.* 1-2. een gelykſoortige

* Ik hebbe deze Rupſen ook nog in *September* gevonden. *Röſel* heeft in zyn III. Deel, *Tab.* VI. *Fig.* 1. 2. 4. nog drieërleie Rupſen vertoond, die anders dan deze van koleur, doch aan ieder zyde insgelyks met eene rei van geele vlakken voorzien waren. Deze van *Fig.* 1. heeft hy zelve voortgekweekt, dog een donkerer Vlinder, dan die op *Tab.* III. in 't I. Deel van de Iſte Claſſe der Nachtvlinders voorkomt, daar uit gekreegen. Ondertuſſchen is het zeker, dat deze Rups met haaren Vlinder van de eigenlyke Wolfsmelkrups (I. Deel. 1ſte Claſſe der Nachtvlinders *Tab.* III.) eene gantſch verſchillende ſoort zy, die zich op het Walſtroo met geele Bloemen (*Gallium*) onthoudt, en 'er haar voedzel van trekt. De Heer Baron *Degeer* heeft ze in zyne Inſectens-Verhandeling, I. Deel, 4de Verhand. *pag.* 122. der Hoogduitſche Overzetting, beſchreeven, en op *Tab.* VIII. *Fig.* 6-11. afgebeeld. Echter zou ze, volgens het bericht van den Heer *Meineiken*, Conrect. te Quedlinburg, (zie Nat. Forſcher I. St. *pag.* 244.) ook op de Weegbree en Wilgen te vinden zyn. Zy verandert wel in een byna diergelyken Vlinder, als die van de Wolfsmelkrups, maar de onderzyde heeft niets van de roode koleur, zo als de andere, en is hier bleek Olyf-groen.

JULY.

BESCHRYVINGE.

Voedzel.		*Röſel.*
	Claſſe. EUPHORBIÆ, *Linn.* p. 802. ſp. 19. de *bonte Olyphant.*	
	142.	
Wyngaard, de groote roode Wederik, de geele Virginiſche Wederik, en Kruidje roerme niet. *Vocia*	De groote gehoornde en geſprenkelde *Wyngaard-Rups*, van de eerſte Claſſe der Nachtvlinders ELPENOR, *Linn.* p. 101. ſp. 17. de *groote Wynvogel*, de *Wyngaards Olyphant.*	I. Deel. Nachtvl. 1ſte Claſſe, *Tab.* IV. *Fig.* 1-6.
	143.	
Wyngaards-bladeren.	De *Wyngaard-Rups*, vercierd met twee oogſpiegels, des Nachtvlinders der eerſte Claſſe. SPHINX CELLERIO, *Linn.* p. 800. ſp 12. de *Phenix.*	IV. Deel. *Tab.* VIII. *Fig.* 1-3.

JULY.

Voedzel.	BESCHRYVINGE.	*Röſel.*
Walſtroo, Kleefkruid, onzer Lievenvrouwen Bedſtroo.	144. De kleine geſprenkelde *Rups*, zonder hoorn, uit de eerſte Claſſe der Nachtvlinders. PROCELLUS, *Linn.* p. 801. ſp. 18. de *kleine Olyphant.*	I. Deel. Naehtvl. 1ſte Claſſe, *Tab.* V. *Fig.* 1-4. en III. Deel. *Tab.* XXXIII.
Meekrap, onzer Lievenvrouwen Bedſtroo.	145. De groene witgeſtreepte, blaauw en geel gehoornde *Rups*, met witte verheven ſtippen, des Nachtvlinders eerſte Claſſe. STELLATARUM, *Linn.* p. 803. ſp. 27. het *bruine Onrustje*, het *Muisje.*	I. Deel. Nachtvl. 1ſte Claſſe, *Tab.* VIII. *Fig.* 1-6.
Sleeſtruiken, Wilge, Pruimen, Kerſen, Eiken, Appel, Peeren- en Beukeboomen; ook Blaauwebeſſen-bladeren.	146. De ſchoone, groote groene *Rups*	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* IV. *Fig.* 1-7. en *Tab.* V. *Fig.* 8-14.

JULY.

Voedzel.	BESCHRYVINGE.	*Röſel.*
	*Rups**, met ronde verheven roode en geele knoppen, des Nachtvlinders tweede Claſſe, PAVONIA MINOR, *Linn.* p. 810. ſp. 7. de *kleine Nacht-Paauwenoog.*	
	147.	
Hagedoorn.	De kleiner bontverwige geknopte, *Rups*, des Nachtvlinders dertweede Claſſe. NOCT. PSI, *Linn.* p. 846. ſp. 135 het *Piekeniertje.*	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* VIII. *Fig.* 1-5.

* Deze is ook nog in de maand *Auguſtus* te vinden. In 't jaar 1776. hebbe ik uit *Stiermarken*, een Mannetjes en Wyfjes-Vlinder dezer ſoorte der Nacht-Paauwenoogvlinders ontvangen, die uit eene even zodanige, dog gantſch zwarte Rups zou voortgekomen zyn. Dit Wyfje was tamelyk gelyk met dat door *Röſel* afgebeeld; maar het Mannetje niet. Echter geleek het naar 't Wyfje, en was van 't zelve alleenlyk door meer gebaarde Sprieten en het dunne achterlyf onderſcheiden.

JULY.

	Beschryvinge.	
	148.	
Voedzel.	De ſnelkruipende helder-en roodgeele hairige *Rups** met weinige vlakken, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders. Purpurea, *Linn.* p. 828. ſp. 67. de *geele Beer.*	*Röſel.*
Kruisbeziën, Steenklaver, Duizendknoop, Sparre, jonge Eikenbladeren.		I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* X. *Fig.* 1-6.
	149.	
Wilde en Tuin Ridderſpooren.	De Violetblaauwe geelgeſtreepte en zwart beſprenkelde *Rups*, van de tweede Claſſe der Nachtvlinders. Noct. Delphinii, *Linn.* p. 857. ſp. 188 het *Ridderſpoortje.*	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* XII. *Fig.* 1-6.

† Men zal deze Rups, niet zo wel in *July*, als in *Mai* en *Juny* volwaſſen vinden. Want in *July* en *Auguſtus* komt ze gemeenlyk uit het Ei te voorſchyn, en als dan eet zy Verkensgras liever, dan de Kruisbeziënbladeren, die haar te wreed zyn. Dieze in 't Voorjaar wil zoeken, moet (zo als de Heer Dr. *Kuhn* in 't 6de Stuk der Nat. Forſcher, p. 75. zeer wel aanmerkt) in *Maart* en *April* onder de op den grond liggende bladeren der gemeene kliſſen, als het goed weer is, naauwkeurig toezien, alwaar men ze zomwylen nog in haar Winterleger vindt.

JULY.

BESCHRYVINGE.

Voedzel.		*Roſel.*
	150.	
Smalbladerige Wilgen, Wolle-Wilgen, Popel- en Eſſe boomen.	De ſchoone diklyvige groene *Rups* met den dubbelden ſtaart, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders. VINULA, *Linn.* p. 815. ſp. 29. de *groote Tweeſtaart* of *Hermelyn-Vlinder.*	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* XIX. *Fig.* 1-17.
	151.	
Wollekruid.	De groenachtig witte en zwartgevlekte *Rups*, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders. NOCT. VERBASCI, *Linn.* p. 850. ſp. 153. de *Wolkruids Rups.*	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* XXIII. *Fig.* 1-5.
	152.	
Melde, Ganzediſtel, Salade, Aardappels, Erwten, Smalleweegbre, Framboizen, Pruim- en Kwetzen bladeren.	De groote, gladde, groene en op verſcheiden wyze getekende *Rups*, van	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* XXIV. *Fig.* 1-5.

JULY.

Voedzel.	BESCHRYVINGE.	*Roſel.*
	van de tweede Claſſe der Nachtvlinders. NOCT. EXSOLETA, *Linn.* p. 849. ſp. 151. de *Roetvlak.*	
	153.	
Mosdiſtel, Salade, enz.	De gladde, zwartbruine en met oranjegeele vlakken beſprenkelde *Rups* des Nachtvlinders der tweede Claſſe. NOCT. UMBRATICA, *Linn.* p. 849. ſp. 150.	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* XXV. *Fig.* 1-6.
	154.	
Haagedoorn, Wilgen, Pruimen	De bondkoleurige geknopte *Rups*, des Nachtvlinders der tweede Claſſe. ANASTOMOSIS, *Linn.* p. 821. ſp. 53.	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* XXVI. *Fig.* 1-5.

JULY.

BESCHRYVINGE.

Voedzel.	155.	*Röſel.*
Zuuring, Mosdiſtel, Kool en Gras; ook Popel, Wollewilgen, ronde Ruigewilgen, Berken- en Elzenloof.	De zwartbruine, bontgeſprenkelde roodhairige *Rups*, des Nachtvlinders der tweede Claſſe. NOCT RUMICIS, *Linn.* p. 852. ſp. 164.	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* XXVII. *Fig.* 1 5.
	156.	
Appel, Eiken, Eſſen, Elzen- en Wilgenbladeren.	De zeegroene, gladde *Rups* *, die op het achterſte lid met ſteekels voorzien is, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders. CAMELINA, *Linn.* p. 832. ſp. 80. het *Kameeltje*, het *Kroonvogeltje*.	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* XXVIII. *Fig.* 1-5
	157.	
Vlookruid, Waterpeper, Zuuring, enz.	De gladde ligtbruine, donker geſtreep-	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* XXXI. *Fig.* 1-4.

* In *July* is ze nog klein, maar in *Auguſtus* en *September* volwaſſen.

JULY.

Voedzel.	BESCHRYVINGE.	*Rõjei.*
	ſtreepte en wit beſprenkelde *Rups** des Nachtvlinders der tweede Claſſe. ATRIPLICIS, *Linn.* p. 854. ſp. 173.	
	158.	
Gemeen Gras en Kweepeeren, ook Wollewilgen Appel- en Kwetzen - Boomen, Framboizen, Sleebladeren en Sparre, enz.	De kleine en ranke, bruingeele, vilthairige *Kwee Rups*, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders. DUMETI, *Linn.* p. 815. ſp. 26 de *Grasjaager*.	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* XXXV. *b. Fig.* 1-3. en *Tab.* XXXV. *a.* de Vlinder *Fig.* 4-5.
	159.	
Pruimen, Kwetzen, Kerſen, Peeren, Perſiken, Eiken, Elzen, Wollewilgen Kattenhout, Haagedoorn, Sleen enz.	De met roode knopjes vercierde graauwe *Borſtelrups*, van de tweede Claſſe der Nachtvlinders. ANTIQUA *Linn.* p. 825. ſp. 56 de *kleine Antiek*.	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* XXXIX. *Fig.* 1-5.

* Ook is ze nog in *Auguſtus* te vinden.

JULY.

BESCHRYVINGE.

Voedzel.	160.	*Röſel.*
Tuin-Salade, Aardbeziënbladeren, enz.	De gladde zwart en geel gevlakte *Saladerups*, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders. *Linn.* O.	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* XLII. *Fig.* 1-5.
	161.	
Kraakbeziën, of Blaauwbeſſen.	De zwarte *Rups*, met geelachtige roode hairen en knoppen uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders. *Linn.* O.	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* XLIV. *Fig.* 1-6.
	162.	
Kraakbeziën, Duizendknoop, of Varkensgras.	De zwarte, met witte Klaverbladvormige vlakken vercierde hairige *Rups**, van de tweede Claſſe der Nachtvlinders. *Linn.* O.	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* XLV. *Fig.* 1-6.

* Zy is ook nog laater tot in *September* te vinden.

JULY.

BESCHRYVINGE.

Voedzel.		*Röſel.*
	163.	
Eikenbladeren, enz.	De blinkende, bleekgroene en ranke *Rups*, met geele ſtreepen, des Nachtvlinders der tweede Claſſe. *Linn.* O.	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* L. *Fig.* 1-4.
	164.	
Pyn, of Sparreboom, enz.	De groote *Pynboom - Rups*, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders. PINI, *Linn.* p. 814. ſp. 284. de *Banduil van de Sparreboomen.*	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* LIX. *Fig.* 1-6.
	165.	
Linden, Wollewilgen, Sleedoorn, en Haagedoorn.	De violetzwarte *Rups*, met geelachtigroode hairborſtels, des Nachtvlinders dertweede Claſſe. LANESTRIS *Linn.* p. 815. ſp. 28	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* LXII. *Fig.* 1-6.

JULY.

BESCHRYVINGE.

166.

Voedzel.		*Röfel.*
Pruimenboom-bladeren, enz.	Het geelachtig groene *Spanrupsje*, met den donkeren Ruggeſtreep, des Nachtvlinders derde Claſſe. SUCCENTURIATA, *Linn.* p. 872. ſp. 267.	I. Deel. Nachtvl. 3de Claſſe, *Tab.* VII. *Fig.* 1-3.

167.

Wilgebladeren, enz.	De dikke, groenachtig graauwe *Bladroller*, des Nachtvlinders der vierde Claſſe. CLORANA, *Linn.* p. 876. ſp. 287.	I. Deel. Nachtvl. 4de Claſſe, *Tab.* III. *Fig.* 1-3.

168.

Groote Brandenetels, wier bladeren hy oprolt, enz.	De groote, groene *Bladroller*, uit de vierde Claſſe der Nachtvlinders. PYRALIS VERTICALIS, *Linn.* p. 882. ſp. 335.	I. Deel. Nachtvl. 4de Claſſe, *Tab.* IV. *Fig.* 1-4.

JULY.

Voedzel.	BESCHRYVINGE.	*Röſel.*
	169.	
Hoppeſtruiken, enz.	Het groene *Springrupsje*, des Nachtvlinders der vierde Claſſe. PYRALS ROSTRALIS, *Linn.* p. 881. ſp. 332.	I. Deel. Nachtvl. 4de Claſſe, *Tab.* VI. *Fig.* 1-5.
	170.	
In veel Struiken en Heggen.	De groene* gezellige *Heggen-Motte*, of *Motrups* met het groote Spinzel, van de vierde Claſſe der Nachtvlinders. TINEA PADELLA, *Linn.* p. 885. ſp. 351. het *Ragrupsje*	I. Deel. Nachtvl. 4de Claſſe, *Tab.* VII. *Fig.* 1-5.
	171.	
In veel Struiken en Heggen.	De geele gezellige *Motrups*, van de vierde Claſſe der	I. Deel. Nachtvl. 4de Claſſe, *Tab.* VIII. *Fig.* 1-5.

* Dit moet eigenlyk zyn, de *graauwe*. Zie *Röſel*, I. Deel, *Tab.* VII. in de 4de Claſſe der Nachtvlinders *pag.* 17. En de Nederduitſche uitgave I. Deel, 2de *Stuk*. *Tab.* VII. *pag.* 533.

JUNY.

BESCHRYVINGE.

Voedzel.	der Nachtvlinders.	*Röſel.*
	EUONYMELLA, *Linn.* p. 885. ſp. 350. de *Rag-Rups van de Paapenboom*	
	172.	
Appelboom-bladeren.	Het kleine hairige *Rupsje*, des Nachtvlinders der vierde Claſſe. SALICELLA, *Linn.* p. 887. ſp. 367.	I. Deel. Nachtvl. 4de Claſſe, *Tab.* IX. *Fig.* 1-4.
	173.	
Appelen en Peeren.	De kleine *Appel-* en *Peerenrups*, uit de vierde Claſſe der Nachtvlinders. POMONELLA, *Linn* p. 892. ſp. 401. 't *Uiltje uit de Appelen en Peeren.*	I. Deel. Nachtvl. 4de Claſſe, *Tab.* XIII. *Fig.* 1-5,
	174.	
Jasmyn, Hennep, Wilge, Wynruite, Aardappelen of Kartoffels, geele Raapen, Liguſter, Meekrap, Kuiſchboom en Netelbladeren.	De ongemeen groote en met geel en blaauw verciere de	III. Deel. *Tab.* I. *Fig.* 1-4. en *Tab.* II. *Fig.* 1-3.

JULY.

Voedzel.	BESCHRYVINGE.	*Röſel.*
	de *Rups*, des Nachtvlinders eerſte Claſſe. SPHINX ATROPOS, *Linn.* p. 799. ſp. 9. het *Doodshoofd.*	
	175.	
Liguſter, Willige, Berken, Syringe.	De ſchoone groene gehoornde *Rups*, met 7 paar ſchuinſe zydeſtreepen, die half purperrood, en half wit zyn, des Nachtvlinders der eerſte Claſſe. SPHINX LIGUSTRI, *Linn.* p. 799. ſp. 8. *Liguſter-Uil, de Hulſter.*	III. Deel. *Tab.* V. *Fig.* 1-6.
	176.	
Pruimen, Kwetzen, Kerſen, Perſiken en Eikenloof, Wollewilgen, Kattenhout Sleeſtruiken, Haagedoorn, Linden en Elzen.	Het kleine *Borſtelrupsje*, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders. ANTIQUA, *Linn.* p. 825. ſp. 56. de *kleine Antiek.*	III. Deel. *Tab.* XIII. *Fig.* 1-4.

JULY.

BESCHRYVINGE.

177.

Voedzel. — *Röſel.*

Oleander, enz. — De groote en ſchoone *Rups*, des Nachtvlinders der eerſte Claſſe. SPHINX NERII, *Linn.* p. 798. ſp. 5. de *Oleander-Rups*. — III. Deel. *Tab.* XV. *Fig.* 1-4. en *Tab.* XVI. *Fig.* 4-6.

178.

Witte en zwarte Popelboomen, ook Wilgen, enz. — De groene *Rups**, met 7 paar ſchuinſe geelachtig-witte ſtreepen, een horizontaalen zydeſtreep en ſpits toeloopenden kop, uit de eerſte Claſſe der Nachtvlinders. SPHINX POPULI, *Linn.* p. 797. ſp. 2. de *Gebakkelde Pylſtaart*. — III. Deel. *Tab.* XXX. *Fig.* 1-4.

179.

Eikenboomen, Espenbladeren. — De ſchoon getekende groen en wit- — III. Deel. *Tab.* XLVIII. *Fig.* 3. en *Kleemanns* Byv. *Tab.* XIII. *Fig.* A-B.

* Ook wordt ze in den laaten Herfſt nog gevonden. KL.

JULY.

Voedzel.	BESCHRYVINGE.	*Röſel.*
	witgeſtreepte *Rups* met geele en roodeſtreepen, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders. *Linn.* O.	
	180.	
Wollewilgen, Beuken-en Eikenboomen,	De byzondere geelgroene *Rups*, met verheven ringen, veele korlige ſtippen en een witachtigen zydeſtreep, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders. TAU, *Linn.* p. 811. ſp. 8.	III. Deel. *Tab.* LXVIII. *Fig.* 1-3. en *Tab.* LXX. *Fig* 4. *a.* 5. *a.* ook IV. Deel. *Tab.* VII. *Fig.* 3-4.
	181.	
Hondskerſe, Caprifoelie, in ſchaduwachtige plaatzen groeiende.	De ongemeen ſchoone, groene een eenzaame *Doornrups*, met ſcherpe roode, doornachtige ſteekels, uit de eerſte Claſſe der Dagvlinders. SIBYLLA, *Linn.* p. 781. ſp. 186.	III. Deel. *Tab.* LXX. *Fig.* 1-3. en *Tab.* XXXIII. *Fig.* 3-4.

JULY.

Voedzel.	BESCHRYVINGE.	*Röfel.*
	182.	
Zuuring en Grasſteeltjes.	De gladde ligtbleeke, effebruine *Rups*, met een graauw-bruinen zwart getekenden kop, en bruine graauwe rug en zydeſtreepen, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders. *Linn.* O.	III. Deel. *Tab.* LXXI. *Fig. e.* 11. en *e.* 12. *Kleemanns* Byv. I. *Tab.* XXIV. *Fig.* 1-6.
	183.	
Espenboomen, enz.	De bruin en graauw geſtreepte *Espenrups*, met geele zydeboorzels, des Nachtvlinders dertweede Claſſe. CURTULA, *Linn.* p. 823. ſp. 52	IV. Deel. *Tab.* XI. *Fig.* 1-6.
	184.	
Woudheide, enz.	Het ongemeen cierlyk groen-en witbonte *Rupsje*, des	IV. Deel. *Tab.* XI. *Fig.* A-C.

JULY.

Voedzel.	BESCHRYVINGE.	*Röſel.*
	des Nachtvlinders der tweede Claſſe. MYRTILLI, *Linn.* p. 853. ſp. 167.	
	185.	
Averone en ſmalle Weegbree enz.	De ſchoon getekende, met oranjegeele en witte Doorns bezette *Rups*, des Dagvlinders der eerſte Claſſe. CINXIA, *Linn.* p. 784. ſp. 205. de *Gebandeerde Mantel.*	IV. Deel. *Tab.* XIII. *Fig.* 1, 2, 3. 6, 7. en *Tab.* XXIX. *Fig.* A-D
	186.	
Peereboomen, enz.	De buitengemeen groote met Turkois blaauwe knoppen en zwarte ſterrepunten vercierde *Rups*, uitde tweedeClaſſe der Nachtvlinders. PAVONIA MAJOR, *Linn.* p. 810. ſp. 7. de *groote Nachtpaauwenoog.*	IV. Deel. *Tab.* XV. *Fig.* 1-3. *Tab.* XVI. XVII. en XXIII. *Fig.* 1-7.

JULY.

BESCHRYVINGE.

Voedzel.	187.	*Röſel.*
Salade, groene bladeren van de Wilde roode Nachtvioolen.	De kleine zwarte en ſteenroode *Beerenrups*, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders PLANTAGINIS, *Linn.* p. 820. ſp. 42	IV. Deel. *Tab.* XXIV. *Fig.* 1-10.
	188.	
Tuin-Salade, Duizendblad, enz	De zeldzaame bruinhairige *Beerenrups*, met den rooden kop en pooten, des Nachtvlinders der tweede Claſſe. VILLICA, *Linn.* p. 820. ſp. 41 de *zwarte Beer*, de *Roomvlak.*	IV. Deel. *Tab.* XXIX. *Fig.* 1-4. en *Tab.* XXVII. *Fig.* 2.
	189.	
Olmen, Popelen, Eiken, Linden, Wilgen, Hagedoorn en Framboizen bladeren.	De ſchoone geelachtig-groene *Rups**, met een ſmallen ligtgeelen rug-	*Kleemanns* Byv. I. *Tab.* XVIII. *Fig.* 1-6.

* Deze is ook in *Juny* reets te vinden.

JULY.

Voedzel.	BESCHRYVINGE.	*Röſel.*
	rugge- en zydeſtreep, ook met verſcheiden witachtige ſtreepen en ſtippen vercierd des Nachtvlinders der tweede Claſſe, *Linn.* O.	
	190.	
Tuin-Salade, Gras, klein Grindkruid of *Scabioſe*, Smalle Weegbree, enz.	De kleine, ongemeen ſnel loopende *Rups*, met bruinroode hairen, een geelen Ruggeſtreep, en zwarten als koper blinkenden kop, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders; RUSSULA, *Linn.* p. 830. ſp. 71.	*Kleemanns* Byv. I. *Tab.* XX. *Fig.* 1-8.
	191.	
Tabaksbladeren, *Cicorey*, Perſikebladeren, enz.	De eenzaame, gladde effe groene *Rups*, uit de tweede Claſſe der Nacht	*Kleemanns* Byv. I. *Tab.* XXIII. *Fig.* 1-7.

JULY.

Voedzel.	BESCHRYVINGE.	*Röſel.*
	vlinders, PLECTA, *Linn.* p. 851. ſp. 157. *Füeſzlin* Verz. der Zwitzerſche Inſecten, pag. 38. n. 734.	
	192.	
Muisooren, Rhynbloemen, ſmalle Weegbree *Scabioſe*, op dorre Heiden groeiende, en wilde Ridderſpooren, enz.	De ſnellooppende, zwarthairige *Beerenrups*, met den geelrooden Ruggeſtreep, des Nachtvlinders der tweede Claſſe, *Linn.* O. 't *Zwarte Beertje.*	*Kleemanns* Byv. I. *Tab.* XXX. *Fig.* 1-5.
	193.	
Berken, Linden, Moerellen, Kerſen, Peeren, Appelen en andere Boomen.	De groote bruinachtig-graauwe, gladde met ſmalle ſtreepjes vierkante vlakken en met tien pooten voorziene *Spanrups*, des Nachtvlinders der derde Claſſe, *Linn.* O.	*Kleemanns* Byv. I. *Tab.* XXXIV. *Fig.* 1-6.

JULY.

BESCHRYVINGE.

194.

Voedzel.

Beuken-en jong-Eikenloof.

Het eenzaame, dikke, geelachtig-groene geelgeboorde *Schildrupsje*, zonder Buikpooten, van de tweede Claſſe der Nachtvlinders; *Linn.* O.

Röſel.

Kleemanns Byv. I. *Tab* XXXVIII. *Fig.* 1-10.

195.

Blaauwebeſſen, Appel-Perſiken-Kwee-en Lindebladeren.

De gladde geelachtig-kaneelbruine *Rups*, die met donkere Ruggeſtreepen en geele zyde boordzels vercierd, en jong zynde groen is, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders; *Linn.* O.

Kleemanns Byv. I. *Tab.* XLII. *Fig.* 1-10.

AUGUSTUS.

BESCHRYVINGE.

196.

Voedzel. — De eenzaame, dikke groene *Rups* met ſchuinſe witte zydeſtreepen, en een blaauwe hoorn zomtyds ook met veele carmynroode vlakken, des Nachtvlinders eerſte Claſſe; SPHINX OCELLATA, *Linn.* p. 796. ſp. 1. de *Pauwoog Pylſtaart* — *Röſel.*

Wilgen, Slee, Oim- en zwarte Popelier Boom. — I. Deel. *Tab.* I. *Fig.* 1-4. en III. Deel. *Tab.* XXXVIII. *Fig.* 4.

197.

Linden, Berken, Eſſen, en Peerenboomen bladeren, enz. — De groene *Rups*, met ſchuinſe roode en geele zydeſtreepen en een blaauwe hoorn des Nachtvlinders eerſte Claſſe; TILIA, *Linn.* p. 797. ſp. 3. de *Linden Rupsuil.* — I. Deel. *Tab.* II. *Fig.* 1-7.

198.

Wolfsmelk, Meekrap, enz. — De groote, ſchoone *Wolfsmelkrups*, des — I. Deel. *Tab.* III. *Fig.* 1-5. en III. Deel. *Tab.* VI. *Fig.* 1, 2, 4, eene diergelyke ſoorte.

AUGUSTUS.

Voedzel.	BESCHRYVINGE.	*Röſel.*
	des Nachtvlinders eerſte Claſſe; EUPHORBIA, *Linn.* p. 802. ſp. 19. de *Bonte Oliphant.*	
	199.	
Wyngaardsbladeren, de groote roode Wederik, geele Virginiſche Wederik, en het Kruidje roer me niet.	De groote met een hoorn voorziene *Wynrups*, des Nachtvlinders eerſte Claſſe; ELPENOR, *Linn.* p. 801. ſp. 17. de *Wyngaards Oliphant*, en met twee oogſpiegels vercierde *Wyngaardrups*, des Nachtvlinders der eerſte Claſſe; SPHINX CELERIO, *Linn.* p. 800. ſp. 12. de *Phœnix.*	I. Deel. Nachtvl. 1ſte Claſſe, *Tab.* IV. *Fig.* 1-7. IV. Deel. *Tab.* VIII. *Fig.* 1-4.
	200.	
Walſtroo, Kleefkruid, geel Walſtroo, of onzer Vrouwen Bedſtroo.	De kleine geſpiegelde *Rups*,	I. Deel. Nachtvl. 1ſte Claſſe, *Tab.* V. *Fig.* 1-9. en *Tab.* IV. *Fig.* 3.

AUGUSTUS.

Voedzel.	BESCHRYVINGE.	*Roſel.*
	zonder hoorn, uit de eerſte Claſſe der Nachtvlinders; PORCELLUS, *Linn.* p. 801. ſp. 18. de *kleine Oliphant.*	
	201.	
De Naalden van Sparre, Pyn- of Denneboomen.	De ſchoone groene, wit-geel- en bruin geſtreepte *Staartrups*, met den ſpringhaanskop, uit de eerſte Claſſe der Nachtvlinders; PINASTRI, *Linn.* p. 802. ſp. 22. de *Pynbooms Pylſtaart.*	I. Deel. Nachtvl. 1ſte Claſſe, *Tab.* VI. *Fig.* 1-7. en *Tab.* V. *Fig* 8-13.
	202.	
De witte en roozen roode Winde, enz.	De groote met een hoorn voorziene op de Winde aazende *Rups*, van de eerſte Claſſe der Nachtvlinders; CONVOLVULI, *Linn.* p. 798. ſp. 6. de *Groote Turk, de Merveille*	I. Deel. Nachtvl. 1ſte Claſſe, *Tab.* VII. *Fig.* 1-5. en III Deel. *Tab.* VI. *Fig.* 3.

AUGUSTUS.

BESCHRYVINGE.

203.

Voedzel.

Meekrab, onzer Vrouwen Bedstroo.

De groene, witgestreepte, blaauw en geele met een hoorn voorziene *Rups*, met verheven witte punten, uit de eerste Classe der Nachtvlinders. STELLATARUM, *Linn.* p. 803. sp. 27. het *bruine Onrustje.*

Röfel.

I. Deel. Nachtvl. 1ste Classe, *Tab.* VIII. *Fig.* 1-6.

204.

Sleestruiken, Wilgen, Pruimen, Kersen, Eiken, Appel, Peeren, Bueken, en Blaauwbessenstruiken.

De schoone, groote, groene *Rups*, met ronde, verheven, roode, en geele knoppen, des Nachtvlinders tweede Classe, PAVONIA MINOR, *Linn.* p. 810. sp. 7. a. de *kleine Nachtpaauwenoog.*

I. Deel. Nachtvl. 2de Classe, *Tab.* IV. *Fig.* 1-7. en *Tab.* V. *Fig.* 8-13.

AUGUSTUS.

BESCHRYVINGE.

205.

Voedzel.		*Roſel.*
Peereboomen, Appelen, Pruimen- en Elzenbladeren.	De groote geknopte *Rups*, met den breeden geelen Ruggeſtreep, uitde tweedeClaſſe der Nachtvlinders. PSI, *Linn.* p. 847. ſp. 135. het *Piekeniertje.*	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* VII. *Fig.* 1-5.

206.

Kruisbeziën, Steenklaver, Duizendknop, Sparren, jonge Eiken.	De ſnelkruipende, ligt en rood geelhairige *Rups*, met witte vlakken, des Nachtvlinders tweedeClaſſe PURPUREA, *Linn.* p. 828. ſp. 67. de *Geele Beer.*	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* X. *Fig.* 1-6.

207.

Tuin-Akeley, Haazekool, Ganze of Mosdiſtel, Kliſſen, Salade, jonge Eſſenbladeren.	De bleekgroene, gladde *Rups**, met witte ſtreepen, des Nacht-	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* XIII. *Fig.* 1-5.

* Zy is ook zomtyds reets in *Juny* te vinden.

AUGUSTUS.

BESCHRYVINGE.

Voedzel.		*Röſel.*
	Nachtvlinders der tweede Claſſe. CHI *Linn.* p. 846. ſp. 136	
	208.	
Linden, Wolle en Kattenhout, Ahorn en Eiken boomen.	De zwarte en geel geſtreepte hairige groote *Rups*, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders. BUCEPHALA, *Linn.* p. 816. ſp. 136. de *Waapendraager*.	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* XIV. *Fig.* 1-7.
	209.	
Smalbladige Wilgen, Wolle Wilgen, Linden, Popel, en Eſſenboomen.	De ſchoone diklyvige groene *Rups* met eendubbelden ſtaart, des Nachtvlinders dertweede Claſſe. VINULA, *Linn.* p. 815. ſp. 29 de *Groote Tweeſtaart*, de *Hermelyn Vlinder*.	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* XIX. *Fig.* 1-17.

AUGUSTUS.

BESCHRYVINGE.

210.

Voedzel.		*Röſel.*
Mosdiſtel, Salade, enz.	De gladde zwartbruine *Rups*, met Oranje geele vlakken beſprenkeld, des Nachtvl. der tweede Claſſe, UMBRATICA, *Linn.* p. 849. ſp. 150. de *graauwe Munnik.*	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* XXV. *Fig.* 1-6.

211.

Zuuring, Mosdiſtel, Kool, Gras, ook op Popelboomen, ronde ruige Wollewilgen, Elſt, Berken, enz.	De zwartbruine, bont geſprenkelde *Rups*, met roſſehairen, des Nachtvlinders tweede Claſſe RUMICIS, *Linn.* p. 852. ſp. 164.	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* XXVII. *Fig.* 1-5.

212.

Appelboomen, Eiken, Elzen, Eſſen en Wilgen.	De zeegroene, gladde *Rups*, die op de achterſte ringen met ſtekels voorzien is, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders. CA-	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* XXVIII. *Fig.* 1-5.

AUGUSTUS.

BESCHRYVINGE.

Voedzel.		*Röſel.*
	CAMELINA, *Linn.* p. 832. ſp. 80. het *Kameeltje*, het *Kroonvogeltje*.	
	213.	
Vlookruid, Waterpeper, Zuuring.	De gladde, helderbruine, donker geſtreepte, wit beſprenkelde *Rups*, des Nachtvlinders tweede Claſſe. ATRIPLICIS, *Linn.* p. 884. ſp. 173.	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* XXXI. *Fig.* 1-4.
	En de kleine *Rups* van de Waterpeper*, des Nachtvlinders tweede Claſſe. OLERACEA, *Linn.* p. 853. ſp. 171.	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* XXXII. *Fig.* 1-4.

* Deze kleine Waterpeper Rups is tot in *September*, en, behalve op de Waterpeper, ook op de Winde, Zuuring en andere Planten meer, te vinden. Zy behoort tot de Moordrupſen, die by gebrek van voedzel andere Rupſen aanvallen en verteeren.

AUGUSTUS.

BESCHRYVINGE.

Voedzel.		*Röſel.*
	214.	
Mosdiſtel, Brandenetels, enz.	De groene gebochelde *Rups*, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders; TRIPLACIA, *Linn.* p. 854. ſp. 175	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* XXXIV. *Fig.* 1-5.
	215.	
Tuin-Salade, Aardraapenkruid enz.	De gladde, zwarte en geelgevlakte *Rups*, van de tweede Claſſe der Nachtvlinders. *Linn.* O.	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* XLII. *Fig.* 1-5.
	216.	
Blaauwebeſſenſtruiken, enz.	De zwarte *Rups*, met geelroode hairen en knopjes, des Nachtvlinders tweede Claſſe. *Linn.* O.	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* XLIV. *Fig.* 1-6.
	217.	
Ridderſpooren in 't Gras, ook jonge Eiken, Linden, Appelboom, Zuuring en doove Netels.	De ſchoone roodbruine *Rups*, met vier geele band-	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* LII. *Fig.* 1-5.

AUGUSTUS.

BESCHRYVINGE.

Voedzel. bandvormige ſtreepen, en een vleeſch verwigen kop, en pooten, des Nacht vlinders tweede Claſſe. PISI, *Linn.* p. 854. ſp. 172. *Röſel.*

218.

Hazelaar, Berkenboomen, enz. De kleine geelachtig-vleeſchverwige *Borſtelrups*, met twee hairige hoornen, uit de tweede Claſſe des Nachtvlinders. CORYLI, *Linn.* p. 823 ſp. 50. de *Hazelaars Rups.* I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* LVIII. *Fig.* 1-5.

219.

Pyn of Sparreboomen, enz. De groote Pynboom *Rups*, des Nachtvlinders der tweede Claſſe. PINI, *Linn.* p. 814. ſp. 24. de *Banduil van de Sparreboom.* I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* LIX. *Fig.* 1-6.

AUGUSTUS.

BESCHRYVINGE.

220.

Voedzel.		*Röſel.*
Alſem, enz.	De bondgevlakte *Rups*, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders. ABSINTHII, *Linn.* p. 845. ſp. 133.	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* LXI. *Fig.* 1-5.

221.

Wilgebladeren, enz.	De dikke groenachtig - graauwe *Bladroller*, uit de vierde Claſſe der Nachtvlinders. CLORANA, *Linn.* p. 876. ſp. 287.	I. Deel. Nachtvl. 4de Claſſe, *Tab.* III. *Fig.* 1-3.

222.

Hoppeſtruiken.	Het groene *Springrupsje*, des Nachtvlinders der vierde Claſſe. PYRALIS ROSTRALIS, *Linn.* p. 881. ſp. 332.	I. Deel. Nachtvl. 4de Claſſe, *Tab.* VI. *Fig.* 1-5.

AUGUSTUS.

BESCHRYVINGE.

223.

Voedzel.		*Röſel.*
Koorn, enz.	De ſchadelyke welbekende witte *Koornworm*, des Nachtvlinders der vierde Claſſe. GRÆNELLA, *Linn.* p. 889. ſp. 377. de *Koornworm.*	I. Deel Nachtvl. 4de Claſſe, *Tab.* XII. *Fig.* 1-14.

224.

Appelen en Peeren.	De kleine *Appel*-en *Peerenrups*, des Nachtvlinders vierde Claſſe. POMONELLA, *Linn.* p. 892. ſp. 401. het *Appel*-en *Peerenuiltje.*	I. Deel. Nachtvl. 4de Claſſe, *Tab.* XIII. *Fig.* 1-5.

225.

Groote Brandnetels, enz.	De groenachtig-graauwe, donker en ligt geſtreepte *Bladroller*, des Nachtvlinders der vierde Claſſe. URTICATA, *Linn.* p. 873. ſp. 272.	I. Deel. Nachtvl. 4de Claſſe, *Tab.* XIV. *Fig* 1-8.

AUGUSTUS.

BESCHRYVINGE.

226.

Voedzel.		*Röfel.*
Jasmyn, Hennip, Kartoffels, Weed, Wynruit, geele Raapen, Liguſter, Meekrab, Hondsbeziën, Kuisboom, Brandenetels.	De ongemeen groote met geel en blaauw fraai vercierde *Rups*, des Nachtvlinders der eerſte Claſſe. SPHINX ATROPOS, *Linn.* p. 799. ſp. 9. het *Doodshoofd.*	III. Deel. Nachtvlinders, 1ſte Claſſe, *Tab.* I. *Fig.* 1-4. en *Tab.* II. *Fig.* 1-3.

227.

Liguſter, Berken, Wilgen, Syringen, enz.	De ſchoone met een hoorn voorziene groene *Rups*, met zeven paar ſchuinſe half purperverwige en half witte zydeſtreepen uit de eerſte Claſſe der Nachtvlinders. SPHINX LIGUSTRI, *Linn.* p. 799. ſp. 8. de *Liguſterrups.*	III. Deel. Nachtvlinders, 1ſte Claſſe, *Tab.* V. *Fig.* 1-6.

228.

Hazelſtruiken, Beukeboomen, enz.	De zonderlinge *Eekhoornrups*, met vier	III. Deel. Nachtvlinders, 2de Claſſe, *Tab.* XII. *Fig.* 1-7.

AUGUSTUS.

BESCHRYVINGE.

Voedzel.		*Röſel.*
	vier lange Voorpooten, en twee Staartpunten, van de tweede Claſſe der Nachtvlinders. *Phal. B.* FAGI, *Linn.* p. 816 ſp. 30. de *Eekhoorn.*	
	229.	
Oleander, enz.	De groote ſchoone *Rups*, des Nachtvlind. eerſte Claſſe. SPHINX NERII, *Linn.* p. 798. ſp. 5. de *Oleanderuil.*	III. Deel. *Tab.* XV. *Fig.* 1-3. en *Tab.* XVI. *Fig.* 4-6.
	230.	
Witte en zwarte Populieren, Wilgen, enz.	De groene *Rups*, met zeven paar ſchuinſe, geelachtig-witte ſtreepen, een rechtlynige zydeſtreep en ſpitstoeloopenden kop des Nachtvlinders der eerſte Claſſe. SPHINX POPULE, *Linn.* p. 797. ſp. 2. de *Pylſtaart.*	III. Deel. *Tab.* XXX. *Fig.* 1-4.

AUGUSTUS.

BESCHRYVINGE.

231.

Voedzel.

Elfrank; Hondskerſen, enz.

De Sagrynachtige groene *Rups*, met een oranjegeelen hoorn, en twee witte zydelinien, des Nachtvlinders der eerſte Claſſe. SPHINX FUCIFORMIS, *Linn.* p. 803. ſp. 28. het *Glaazen Onruſtje.*

Röſel.

III. Deel. *Tab.* XXXIV. *Fig.* 1-4. en IV. Deel. *Tab.* XXXVIII. *Fig.* 1, 2.

232.

Roomſche Kamillen, Averone, enz.

De ſchoone groene *Kamillenrups*, met roode doornachtige punten, des Nachtvlinders dertweede Claſſe. ARTEMISIA

III. Deel. *Tab.* LI. *Fig.* 1 - 4. Walchs Natuur Onderz. IX. St. *pag.* 114.

233.

Wolle Wilgen, Bucken, enz.

De byzondere geelgroene *Rups*, met verheven ringen, veele korlige punten en een witach-

III. Deel. *Tab.* LVIII *Fig.* 1-3. en *Tab.* LXX. *Fig.* 4. a. 5. a. Mitsgaders IV. Deel. *Tab.* VII. *Fig.* 3, 4.

AUGUSTUS.

BESCHRYVINGE.

Voedzel. | *Röſel.*

achtig zydenſtreep des Nachtvlinders der tweede Claſſe. TAU, *Linn.* p. 811 ſp. 8.

234.

Hondskerſen, met zwarte Vrugten, Caprefolie, Elfrank, in dalen en ſchaduwachtige plaatzen groeiende.

De ongemeen ſchoone, groene, eenzaame *Doornrups*, met roode doornachtige ſteekels, des Nachtvlinders der eerſte Claſſe. SIBYLLA. *Linn.* p. 781. ſp. 186

III. Deel. *Tab.* LXX. *Fig.* 1-3. en *Tab.* XXXIII. *Fig.* 3, 4.

235.

't Gras aan de Heggen, Mosdisſtel.

De donker-kaneel-bruine, of bruinroode *Rups*, met drie bandvormige hoog geele ſtreepen, en bruine pooten, des Nachtvlinders der tweede Claſſe. *Linn.* O.

III. Deel. *Tab.* LXXI. *Fig.* d. 10.

AUGUSTUS.

BESCHRYVINGE.

Voedzel.	236.	*Röſel.*
Zuuring, en de onderſte ſteelen van 't Gras.	De gladde bleeke, eſſe bruinachtige *Rups*, met een graauwbruinen zwart getekenden kop, bruingrauwen rug, en zyde liniën, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders. *Linn.* O.	III. Deel. *Tab.* LXXI *Fig. c.* 11 en *e.* 12. en *Kleemanns* Byv I. *Tab.* XXIV. *Fig.* 1-6.
	237.	
Averone, ſmalle Weegbree, enz.	De ſchoon getekende *Rups*, met oranjegeele en witte Doornen, des Dagvlinders der eerſte Claſſe. CINXIA, *Linn.* p. 784. ſp. 205. de *Gebandeerde Mantel.*	IV. Deel. *Tab.* XIII. *Fig.* 1-3. 6. 7. *Tab.* XXIX. *Fig.* A-D.
	238.	
Peereboomen.	De buiten, gemeen groote, met Turkois-blaauwe knop-	IV. Deel. *Tab.* XV. *Fig.* 1-3. *Tab.* XVI. XVII. en *Tab.* XXII. *Fig.* 1-7.

AUGUSTUS.

BESCHRYVINGE.

Voedzel. knoppen en zwarte ſterrepunten vercierde *Rups*, des Nachtvlinders tweede Claſſe. PAVONIA MAJOR, *Linn.* p. 810. ſp. 7. var. β. de *Nachtpaauwenoog*. *Röſel.*

239.

Wilgeboomen, enz. De gladde, ſchoon, geelachtig groene *Rups*, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders LIBATRIX, *Linn.* p. 831. ſp. 78. 't *Lekkerbeetje*, of eigenlyk MODESTA, volgens *Mullers Faun.* Fredrichsdal. p. 42. N 378. IV. Deel. *Tab.* XX. *Fig.* 1-4.

240.

Salade, groene Bladeren van de Wilde Roode Nachtviolen enz. De kleine zwarte en ſteenroode *Beeren-* IV. Deel. *Tab.* XXIV. *Fig.* 1-10

AUGUSTUS.

BESCHRYVINGE.

Voedzel.		*Röſel.*
	renrups, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders. PLANTAGINIS, *Linn.* p. 820. ſp. 42	
	241.	
Tuin-Salade; Duizendblad enz.	De zeldzaame bruinhairige *Beerenrups*, met een roode kop en pooten, des Nachtvlinders tweede Claſſe. VILLICA, *Linn.* p. 820. ſp. 41. de *zwarte Beer*, de *Roomvlak*.	IV. Deel. *Tab.* XXIX. *Fig.* 1-4. en *Tab.* XXVIII. *Fig.* 2.
	242.	
Wilde en tamme Kaſtanjeboomen, Kwetzen, Haanebeuks enz.	De hoog geele en langhairige *Rups*, met negen paar gedeeltelyk geele, en gedeeltelykroode pyramiedsvormige borſtels vercierd, des Nachtvlinders dertweede Claſſe. ACERIS, *Linn.*	*Kleemanns* Byv. I. *Tab.* XVII. *Fig.* 1-5. en IV. Deel. *Tab.* IV. *Fig.* 5.

AUGUSTUS.

BESCHRYVINGE.

Voedzel.

Linn. p. 846. ſp. 137. zie ook *Füeſzlin* Verz. der Zwitzerſche Inſecten, pag. 38. n. 723.

Rüſel.

243.

Tabak, Cicorei, Perſikebladeren.

De eenzaame, gladde, effe groene *Rups*, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders.

Kleemanns Byv. I. *Tab.* XXIII. *Fig.* 1-7.

PLECTA, *Linn.* p. 851. ſp. 157. zie ook *Füeſzlin* Verz. der Zwitzerſche Inſecten, p. 38. n. 734.

244.

De bladen en ſteelen van de kleene Ganzevoetplant.

De gladde, met hoekige ringen en tekeningen, voorziene tien pootige *Spanrups*, des Nachtvlinders der derde Claſſe. *Linn.* O. *Chenopodiata.*

Kleemanns Byv. I. *Tab.* XXXVII. *Fig.* 1-10.

AUGUSTUS.

BESCHRYVINGE.

245.

Voedzel.

Bueken- en teder Eikenloof, enz.

Het eenzaame, dikke, geelachtig-groene, geel geboordeerde *Schildrupsje*, zonder buikpooten, uit de tweede Classe der Nachtvlinders. *Linn.* O.

Röſel.

Kleemanns Byv. I. *Tab.* XXXVIII. *Fig.* 1-10.

246.

De bladeren van Framboizen, Aalbeziën, Eiken, Kerſſen, Appel, Peeren, Wilgen, en zwarte Popelier, enz.

De nu eens bruine, dan graauwe, of ook geelachtig groene, groote, gladde takvormige *Spanrups*, met den geſpleeten driekantigen geelen kop, en tien pooten, des Nachtvlinders derde Classe. BETULARIA, *Linn.* p. 862. ſp. 217. *Meeter*, *Tooren-Kop.*

Kleemanns Byv. I. *Tab.* XXXIX. *Fig.* 1-7.

AUGUSTUS.

Beschryvinge.

247.

Voedzel.

Blaauwbeſſenſtruiken, Appel, Perſike, Queeen Lindebladeren, enz.

De gladde, geelachtig kaneelbruine *Rups*, met donkere ruggeſtreepen, en geele zyboordzels vercierd doch die eerſt groen zyn, des Nachtvlinders der tweede Claſſe. *Linn.* O.

Röſel.

Kleemanns Byv. I. *Tab.* XLII. *Fig.* 1-10.

248.

Zwarte en Blaauwebeſſenſtruiken, en ſmalle Weegbree enz.

De gladde geelachtig groene *Rups* met bruine roode rugtekeningen, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders. *Linn.* O.

Kleemanns Byv. I. *Tab.* XLIII. *Fig.* 1-7.

SEPTEMBER.

BESCHRYVINGE.

Voedzel.	249.	*Röſel.*
Naalden van Pyn- of Denneboomen.	De ſchoon groene, geel witte en bruingeſtreepte *Hoornrups*, met den Springhaanskop, uit de eerſte Claſſe der Nachtvlinders. PINASTRI, *Linn.* p. 802. ſp. 22. de *Pynbooms Pylſtaart.*	I. Deel. Nachtvl. 1ſte Claſſe, *Tab.* VI. *Fig.* 1-5.
	250.	
Appel, Peeren, Pruim, en Elzebladeren.	De groote geknopte *Rups*, met een breeden geelen ruggeſtreep, des Nachtvlinders der tweede Claſſe. PSI, *Linn.* p. 846. ſp. 135. de *Piekenier.*	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* VII. *Fig.* 1-5.
	251.	
Smalbladige en Wolle Wilgen, Popel, Eſſen en Lindebladeren.	De ſchoone diklyvige groene *Rups* met den dubbelden ſtaart, des Nachtvlin-	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* XIX. *Fig.* 1-17.

SEPTEMBER.

BESCHRYVINGE.

Voedzel.		*Röſel.*
	vlinders dertweede Claſſe. VINULA, *Linn.* p. 815. ſp. 29. de *Groote tweeſtaart*, de *Hermelynvlinder.*	
	252.	
Zuuring, Mosdiſtel, Kool, Gras, ook op Popelboomen, Wolle en ronde ruige Wilgen, Berken en Elzen.	De zwartbruine bontgeſpikkelde roodhairige *Rups*, van de tweede Claſſe der Nachtvlinders. RUMICIS, *Linn.* p. 852. ſp. 164.	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* XXVII. *Fig.* 1-5.
	253.	
Ridderſpooren, in 't gras, ook jonge Eiken, Linden en Appelboom Bladeren, Zuuring en doove Netelen.	De ſchoone roodbruine *Rups*, met viergeele bandvormige ſtreepen, een vleeſchverwigen kop en pooten, des Nachtvlinders der tweede Claſſe, PISI, *Linn.* p. 854. ſp. 172.	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* LII. *Fig.* 1-5.

SEPTEMBER.

BESCHRYVINGE.

Voedzel.	254.	*Röſel.*
Hazelaar, Berkenboomen, enz.	De kleine geelachtig vleeſchverwige *Borſtelrups*, met twee hairbosjes, des Nachtvlindersder tweede Claſſe. CORYLI, *Linn.* p. 823. ſp. 50. *Hazelaars-Uil.*	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* LVIII. *Fig.* 1-5.
	255.	
Alſem, enz.	De bontgevlakte *Rups*, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders. ABSENTHII, *Linn.* p. 845 ſp. 133.	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* LXI. *Fig.* 1-5.
	256.	
Pruimboombladeren, enz.	Het geelachtig-groene *Spanrupsje*, met een donkeren ruggeſtreep, des Nachtvlinders derde Claſſe. SUCCENTURIATA, *Linn.* p. 872. ſp. 267.	I. Deel. Nachtvl. 3de Claſſe, *Tab.* VII. *Fig.* 1-3.

SEPTEMBER.

BESCHRYVINGE.

257.

Voedzel.

Koorn.

De ſchadelyke witte *Koornworm*, uit de vierde Claſſe der Nachtvlinders. GRANELLA, *Linn.* p. 889, ſp. 377. de *Koornworm*.

Röſel.

I. Deel. Nachtvl. 4de Claſſe, *Tab.* XII. *Fig.* 1-8.

258.

Groote Brandenetels, enz.

De groenachtig graauwe, donker en ligt geſtreepte *Bladroller*, uit de vierde Claſſe der Nachtvlinders. URTICA, *Linn.* p. 873. ſp. 272.

I. Deel. Nachtvl. 4de Claſſe, *Tab.* XIV. *Fig.* 1-8.

259.

Jasmyn, Hennip, Kartoffelen, Weet, Wynruit, geele Raapen, Liguſter, Meekrap, Hondsbeziën, Kuisboom en Brandenetel-Bladeren.

De ongemeen groote met geel en blaauw ſchoon ver-

III. Deel. *Tab.* I. *Fig.* 1-4. en *Tab.* II. *Fig.* 1-3.

SEPTEMBER.

BESCHRYVINGE.

Voedzel. vercierde *Rups**, des Nachtvlinders der eerſte Claſſe. SPHINX ATROPOS, *Linn.* p. 799. ſp. 9. de *Doodshoofd Uil.* *Röſel.*

260.

Ridderſpooren, enz. De kleine helderbruine zwarte gevlakte *Doornrups*, met den witten ruggeſtreep, uit de eerſte Claſſe der Dagvlinders. EUPHROSYNE†, *Linn.* p. 786. ſp. 214. III. Deel. *Tab.* X. *Fig.* 1-4.

* De beroemde Heer *D. Kulm* in *Eiſenach*, heeft (zie de Nat. Forſcher, IX. St. *pag.* 94.) eene zodanige Rups, die anders, wanneer zy in den laaten Herfſt gevonden wordt, in haare Poppengeſtalte veeltyds verlooren gaat, en in 't volgende Jaar zelden een Vlinder uitlevert, nochtans gelukkig tot verandering gebragt, en 'er in de volgende maand May een volkomen *Sphinx Atropos* uit gekreegen. Hy deedt ze in een ruim glas, gevuld met vier vingers breed vochtig Zand, bedekte het glas, en zette hetzelve onder den warmen Kachel; beſprengde het Zand, van tyd tot tyd, met friſch water, en behield alzo de Pop en eindlyk ook den Vlinder in 't leeven.

KL.

† *Linnæus* haalt dezen Vlinder aan by de *Lathonia*, p. 786. ſp. 213. dog volgens *Scopoli Entomol*, *Carn. pag.* 162. n. 440. ſchynt hy eerder de volgende zoort de *Euphroſyne*, ſp. 214. te zyn.

KL.

SEPTEMBER.

BESCHRYVINGE.

261.

Voedzel.

Zuuring en de onderſte Gras-Steelen.

De gladde, bleeke, effe bruinachtige *Rups*, met den graauw - bruinen zwartgetekenden kop, bruingraauwe rugge en zydeliniën, des Nachtvlinders dertweede Claſſe. *Linn.* O.

Röſel.

III. Deel. *Tab.* LXXV. *Fig. e.* 11. en *e.* 12. *Kleemanns* Byv. I. *Tab.* XXIV. *Fig.* 1-6.

262.

Buekebladeren, enz.

De uitneemend ſchoone geelachtig groene *Rups*, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders. TORTRIX PRASINANA, *Linn.* p. 875. ſp. 285.

IV. Deel. *Tab.* XXII. *Fig.* 1-5.

263.

Wolfsmelk, Kwek-en Boſchgras, Wilde Byvoet, Tuin-Salade en Duizendblad.

De *Beerenrups*, met bruinachtig graauwe hairen, van de tweede Claſſe der Nachtvlinders. HEBE, *Linn.* p. 820. ſp. 40.

Kleemanns Byv. I. *Tab.* XIII. *Fig.* 1-4. IV. Deel. *Tab.* XXVII. *Fig.* 1, 2.

SEPTEMBER.

BESCHRYVINGE.

264.

Voedzel.

Tabak, Cicorey, enz.

De eenzaame, gladde, effe groene *Rups*, des Nachtvlindersdertweede Claſſe. PLECTA, *Linn.* p. 851. ſp. 157. zie ook *Füeſzlin* Verzamel. der Zwitzerſche Inſecten pag. 38. n. 734.

Röſel.

Kleemanns Byv. I. *Tab.* XXIII. *Fig.* 1 - 7.

265.

Gemeene Klaver, enz.

De bruinachtig geele, bruingeſtreepte, gladde *Spanrups*, met veertien pooten, des Nachtvlinders derde Claſſe. GLYPHICA, *Linn.* p. 838. ſp. 105. zie ook *Füeſzlin* Verz. der Zwitzerſche Inſ. p. 37. n. 699.

Kleemanns Byv. I. *Tab.* XXV. *Fig.* 1 - 10.

SEPTEMBER.

Voedzel.	BESCHRYVINGE.	*Röſel.*
	266.	
De Bladeren en Steelen van den kleinen Ganzevoet, enz.	De gladde, met hoekige ringen, en tekeningen voorziene tienpootige *Spanrups*, uit de derde Claſſe der Nachtvlinders. *Linn.* O.	*Kleemanns* Byv. I. *Tab.* XXXVII. *Fig.* 1-10.
	267.	
Beuken en jong Eikenloof, enz.	Het eenzaame, dikke, geelachtig-groene, geel geboorde *Schildrupsje*, zonder buikpooten, des Nachtvlinders dertweede Claſſe. *Linn.* O.	*Kleemanns* Byv. I. *Tab.* XXVIII. *Fig.* 1-10.
	268.	
Framboizen en Aalbeziën, Eiken, Kerſen, Appel en Peeren: Wilgen en Popelier, enz.	De nu eens bruine dan graauwe, ook wel geelachtig groene, groote, gladde takvormige *Spanrups*, met een geſpleeten driehoekigen	*Kleemanns* Byv. I. *Tab.* XXXIX. *Fig.* 1-7.

SEPTEMBER.

BESCHRYVINGE.

Voedzel.

kigen bruingeelen kop en tien pooten, des Nachtvlinders derde Claſſe. BETULARIA, *Linn.* p. 862. ſp. 217. *Meeter Tooren-Kop.*

Röſel.

269.

Blaauwbeſſen, Kween- en Linde Bladeren, enz.

De gladde geelachtige kaneelbruine *Rups*, met donkere ruggeſtreepen en geele zydeboordzels vercierd doch die in 't eerſt groen is, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders. *Linn.* O.

Kleemanns Byv. I. *Tab.* XLII. *Fig.* 1-10.

270.

Blaauwbeſſen, en Smalle Weegbree, enz.

De gladde geelachtig-groene *Rups*, met bruinroode rugtekeningen, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders. *Linn.* O.

Kleemanns Byv. I. *Tab.* XLIII. *Fig.* 1-7.

OCTOBER.

BESCHRYVINGE.

271.

Voedzel.		*Röſel.*
Beukebladeren, enz.	De uitneemend ſchoone geelachtig groene *Rups*, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders. TORTRIX PRASINANA, *Linn.* p. 875. ſp. 285.	IV. Deel. *Tab.* XXII. *Fig.* 1-5.

272.

Boſchgras, enz.	De ſchoone grasgroene *Rups*, met den ronden kop, zonder Doornen, des Dagvlinders eerſte Claſſe ÆGERIA, *Linn.* p. 771. ſp. 143. *het Bonte Zandoogje.*	IV. Deel. *Tab.* XXXIII. *Fig.* 3. A. *Kleemanns* Byv. I. *Tab.* XIX. *Fig.* A. B.

273.

Beukenboom en Eikenloof, enz.	De kleine kaneelbruine *Rups*, met eenehoog vleeſchverwige vlak, en een zonderlingen rug en ſtaartpunt,	*Kleemanns* Byv. I. *Tab.* XXI. *Fig.* 1-7.

OCTOBER.

Voedzel.	BESCHRYVINGE.	*Röfel.*
	zonder achterpooten, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders. FALCATARIA, *Linn.* p. 859. ſp. 202. de *Eenſtaart.*	
	274.	
Tuin-Salade, Liguſter.	De blaauwachtig groene, met een geel halsboordzel vercierde *Rups*, des Nachtvlinders tweede Claſſe; het *kleine Doodshoofd* genaamd*. *Linn.* O	*Kleemanns* Byv. I. *Tab.* XXII. *Fig.* 1-6.
	275.	
Afgevallen bladeren van Hagedoorn en Beukeloof, in de boſſen.	Het zonderling kleine blinkend, witachtig okergeel ſchild-	*Kleemanns* Byv. I. *Tab.* XXXVI. *Fig.* 1-10.

* Ook in *September* wordt ze op de Liguſter gevonden. Doch van myne Afbeelding, vervaardigd naar die vanden beroemden Heer *D. Gladbach* in Frankfort, moete ik erinneren, dat ze de natuurlyke niet veel gelykt. Zy is te lang, en de Vlinder heeft ook zelden het teken des Doodshoofds zo duidelyk, als het Natuurlyk Exemplaar, dat ik, toen ik de Afbeelding maakte, voor my, en de Heer *D. Gladbach* daar op waargenomen had:

OCTOBER.

BESCHRYVINGE.

Voedzel.

schildpadvormig *Rupsje*, des Nacht vlinders der vierde Classe. *Linn.* O.

Röſel.

276.

Beuken- en teder Eikenloof, enz.

Het eenzaame, dikke, geelachtig-groene, geel geboorde *Schild-rupsje*, zonder buikpooten, uit de tweede Classe der Nachtvlinders. *Linn.* O.

Kleemanns Byv. I. *Tab.* XXXVIII. *Fig.* 1-10.

277.

Framboizen, Aalbeziën, Eiken, Kerſen, Appel, Peeren, Wilgen, en zwarte Popelier, enz.

De nu eens bruine, dan graauwe, of ook geelachtig groene, groote, gladde takvormige *Spanrups*, met een geſpleeten driehoekigen bruin-geelen kop en tien pooten, uit de derde Classe der Nachtvlinders, *Linn.* O.

Kleemanns Byv. I. *Tab.* XXIX. *Fig.* 1-7.

NOVEMBER.

BESCHRYVINGE.

278.

Voedzel.

Tuin-Salade, Liguſter.

De blaauw groene, met een geel halsboordzel vercierde *Rups*, des Nachtvlinders der tweede Claſſe; het *kleine Doodshoofd* genaamd. *Linn.* O.

Röſel.

Kleemanns Byv. I. *Tab.* XXII. *Fig.* 1-6.

LENTE.

BESCHRYVINGE.

279.

De Bladeren van allerhande Ooſtboomen, Vogelkerſen, Hagedoorn, Sleeſtruiken, enz.

De ſchadelyke gezellige oranjegeele *Rups**, met

Dagvlin: I. Deel. ~~Nachtvl.~~ 2de Claſſe, *Tab.* III. *Fig.* 1-7.

* Zy komen jaarlyks tweemaal te voorſchyn. De Rupſen, die van *April* tot in *Juny* gezien worden, zyn uit een overwinterd broedzel, dat in den voorigen Herfſt uit de Eieren gekomen is, en deze veranderen dan gemeenlyk in *Juny* in Vlinders, welke wederom in *July* hunne Eieren leggen, waaruit alsdan in *Auguſtus* de jonge Rupſen voortkomen, die in een Weefzel gezaamenlyk overwinteren en daarop in de volgende Lente weder te voorſchyn komen: Wanneer 't overwinterd Broedzel nog vroeg genoeg (in 't begin van *Juny*) in Vlinders verandert, gebeurt het zomwylen, dat van dezelven nog in 't zelfde jaar, omtrent het uiteinde van *Auguſtus*, de Vlinders te voorſchyn komen, en dezelve aldus ook tweemaal in één jaar gezien worden: dan dit gebeurt, volgens myne ondervinding, zelden; even zo zelden verandert ook dit laatſte broedzel nog voor den Winter in zodanige Poppen, die als Poppen overwinteren, en in de Lente als Vlinders verſchynen. Vermits deze Vlinders menigmaal in groot aantal gezien worden, en by hunne uitkomſt uit de Pop een rood ſap van zich geeven, zou iemand zulks wel voor een bloedregen konnen aanzien.

LENTE.

BESCHRYVINGE.

Voedzel.		*Röſel.*
	zwarte rugge-en zydeſtreepen, des Dagvlinders tweede Claſſe. CRATAEGI, *Linn.* p. 758. ſp. 72. Ze leeven, jong zynde, in een Weefzel by elkander. De *geaderde witte Kapel.*	
	280.	
Sleeſtruiken, Pruimen-en Kerſeboomen.	Het dikke, gras groene en geel geboorde *Schildrupsje*, uit de tweede Claſſe der Dagvlinders. BETULÆ *Linn.* p. 787. ſp. 220. het *groote oranje Schildpagetje.*	I. Deel. Dagvl. 2de Claſſe, *Tab.* VI. *Fig.* 1-4.
	281.	
Gras langs de Haagen, Kwekgras.	De groote, bruinhairige, geboorde, van vooren en van	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* II. *Fig.* 1-8.

LENTE.

Beschryvinge.

Voedzel.		*Röfel.*
	achteren met eene hairige kuif begroeide *Grasrups*, des Nachtvlinders tweede Classe. Potatoria, *Linn.* p. 813. sp. 23. de *Dronkert*.	
Allerhande Ooftboomen.	282. De schadelyke, hairige, bruine *Rups*, met een grooten kop, en roode en blaauwe knopjes, des Nachtvlinders tweede Classe. Dispar, *Linn.* p. 821. sp. 44. de *Roozeboomen Schender*.	I. Deel. Nachtvl. 2de Classe, *Tab.* III. *Fig* 1-6.
Wilgen, Espen en zwarte Popelieren.	283. De bruinhairige *Rups**, met witte Rug-	I. Deel. Nachtvl. 2de Classe, *Tab.* IX. *Fig.* 1-8.

* Men vindt ze, benevens haaren Vlinder, jaarlyks tweemaal, als eens van *April* tot *Juny*, voorts van *July* tot in *Augustus*. Van 't eerste broedzel komt de Vlinder gemeenlyk in *Juny* uit de Pop, en van het tweede in *September*. De Eieren overwinteren alsdan, en brengen in *April* de jonge Rupsen te voorschyn.

LENTE.

BESCHRYVINGE.

Voedzel.		*Röſel.*
	Ruggeſchilden en roodbruine bulten of knoppen, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders. SALICIS, *Linn.* p. 822. ſp. 46. de *Verre-Ziender.*	
Kruisbeziënloof Steenklaver, Verkensgras, Dennen en jonge Eiken, enz.	284. De ſnelkruipende ligt en roodgeelhairige *Rups*, met witte vlakken, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders. PURPUREA, *Linn.* p. 828. ſp. 67. de *Geele Beer.*	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* X. *Fig.* 1-7.
Appelen, Peeren, Pruimen, Kerſen en andere Ooſtboomen, ook Sleeſtruiken.	285. De dikke, Zeegroene, geelgeſtreepte en zwart geſtipte *Rups*, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders. CÆRULEOCEPHALA *Linn.* p. 826. ſp. 59 de *zonder Zomer.*	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* XVI *Fig.* 1-5.

LENTE.

Beschryvinge.

286.

Voedzel.

Alle Ooftboomen, Eiken, Linden, Vuilboom, Slee- en Hagedoornloof.

De kleine, hairige, zwarte, roodgeſtreepte en wit gevlakte *Rups*, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders. Cygni Similis, de *Zwaan*. Zie ook *Füeſzlin* Verz. der Zwitzerſche Inſecten, p. 35. n. 662.

Röſel.

I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* XXI. *Fig.* 1-6.

287.

Alle Ooftboomen, Eiken, enz.

De gezellig bruine, roodhairige, ſchadelyke *Boomrups*, des Nachtvlinders dertweede Claſſe. Chrysorrhea, *Linn.* p. 822. ſp. 45. het *Donskakkertje*.

I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* XXII. *Fig.* 1-5.

LENTE.

BESCHRYVINGE.

288.

Voedzel.

Pruimen, Kwetzen Haanebeuke.

De graauwe, bruin gevlakte *Rups*, met een ſtaart als een viſch, des Nachtvlinders dertweede Claſſe. PRUNI, *Linn.* p. 813. ſp. 22. de *Viſchſtaart.*

Röſel.

I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* XXXVI. *Fig.* 1-6.

289.

Gemeen gras, zit aan de Eikenſtammen, Kwetzen, Appelboomen, welker Bladeren zy eet.

De groote hairige *Grasrups*, met veele wratten en knopjes voorzien, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders. QUERCIFOLIA, *Linn.* p. 812. ſp. 18 het *verdorde Blad. Le paquet de feuille ſeche.*

I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* XLI. *Fig.* 1-7.

290.

Kerſen, Peeren, Appelen, Pruimen, enz.

De ranke zwartbruine *Spanrups*, uit de derde Claſſe der Nachtvlinders.

I. Deel. Nachtvl. 3de Claſſe, *Tab.* I. *Fig.* 1-6.

GE-

LENTE.

BESCHRYVINGE.

Voedzel.	GEOM. ALNIARIA, *Linn.* p. 860. sp. 205.	*Rösel.*
	291.	
Kruisbeziën en Aalbessen, ook Sleedoornbladeren.	De graauwachtig witte *Spanrups*, met den geelen buik en zwartevlakken op den rug des Nachtvlinders derde Classe. GEOM. GROSSULARIATA, *Linn.* p. 867 sp. 242. het *Aalbessen-Uiltje.*	I. Deel. Nachtvl. 3de Classe, *Tab.* II. *Fig.* 1-5.

VOORZOMER.

BESCHRYVINGE.

	292.	
Groote Brandnetels, eigenlyker op Wolle Wilgen en Nachtviolen, enz.	De eenzaame bruine *Doornrups*, met een breeden geele ruggestreep, uit de eerste Classe der Dagvlinders. PAPHIA, *Linn.* p. 785. sp. 209. de *gestreepte parlemoer Kapel.*	I. Deel. Dagvl. 1ste Classe, *Tab.* VII. *Fig.* 1-5.

VOORZOMER.

BESCHRYVINGE.

293.

Voedzel.		*Röſel.*
Sleeſtruiken, Pruimeboomen, Kerſen en Perſike boomen, enz.	Het dikke grasgroene en geel geboorde *Schildrupsje*, uit de tweede Claſſe der Dagvlinders. BETULAE, *Linn.* p. 787. ſp. 220. Het *groote oranje Schildpagetje.*	I. Deel Dagvl. 2de Claſſe, *Tab.* VI. *Fig.* 1-4.

294.

Kool en Salade ook Look zonder Look.	Het zeer kleine *Kool*- en *Saladerupsje** , uit de vierde Claſſe der Nachtvlinders. XYLOSTELLA, *Linn.* p. 890. ſp. 389.	I. Deel. Nachtvl. 4de Claſſe, *Tab.* X. *Fig.* 1-5.

295.

Allerhande Ooftboomen, Framboizen in boſſen.	De platte, bruinachtig graauwe *Spanrups*, met een hartvormig verdeelden kop, en een ligten ruitvormigen zwart ge-	*Kleemanns* Byv. *Tab.* XXVII. *Fig.* 1-8. en *Tab.* XIV. *Fig.* 1, 2.

* Doch dit Rupsje is ook reets in 't begin van *Juny* te vinden.
En men vindt het tot aan 't einde van den Zomer.

VOORZOMER.

Voedzel.	BESCHRYVINGE.	*Röſel.*
	tekenden rug, met tien pooten voorzien*; uit de derde Claſſe der Nachtvlinders. *Linn.* O.	

ZOMER.

	296.	
Wilgen, Berken, Wolle Wilgen, Eſſen, enz.	De groote gezellige *Doornrups*† met geel-roode vlakken, des Dagvlinders eerſte Claſſe. ANTIOPE, *Linn.* p. 776. ſp. 165. de *Bonte Mantel.*	I. Deel. Dagvl. 1ſte Claſſe, *Tab.* I. *Fig.* 1-6.

* Men vindt dezelve reeds voor 't einde van *Juny*.

VERT.

† Deze Doornrups en haar Vlinder komen jaarlyks tweemaal te voorſchyn; want ik hebbe denzelven zo wel in 't begin van *Mai*, als in den ſpaden *Herfſt* gevangen. Zy, die in 't begin van *Mai* vliegen, zyn uit overwinterde Poppen voortgekomen, het welk aan de ſchoone onbeſchadigde vleugels blykt, die, wanneer zy overwinterd waren, niet wel zo ſchoon konden zyn. Doch de Eieren der genen, die in den laaten *Herfſt* vliegen, overwinteren ook, en brengen, met het uitbotten der knoppen in 't Voorjaar, hunne Rupſen voort.

KL.

ZOMER.

BESCHRYVINGE.

297.

Voedzel.		*Röſel.*
Kerſen, Peeren, Wilgen, Espen enz.	De op de Kerſeboomen levende zwartachtige en gezellige *Doornrups**, met geele doornpunten, uit de eerſte Claſſe der Dagvlinders. POLYCHLOROS, *Linn.* p. 777. ſp. 166. de *groote Aurelia.*	I. Deel. Dagvl. 1ſte Claſſe, *Tab.* II. *Fig.* 1-8.

298.

Groote Brandnetels, ook wil men dat ze Hoppenloof eeten.	De gezellige fluweelzwarte *Doornrups*†, van de eer-	I. Deel. Dagvl. 1ſte Claſſe *Tab.* III. *Fig.* 1-6.

* Zy is door een amberachtigen reuk van eene andere te onderſcheiden, die men beſpeurt, wanneer men de Doos opent waarin 'er veelen bewaard worden. De Vlinder vliegt jaarlyks tweemaal, en de laate Poppen overwinteren. Uit dezelve zag ik eens in 't midden van den Winter, naamlyk den 16 *January* 1776. op een tamelyk warmen dag, een Vlinder te voorſchyn komen.

KL.

† Ook deze is jaarlyks tweemaal, naamlyk in *July* en *September*, te vinden. De Vlinder vliegt terſtond met den aankomſt der Lente, en in den Herfſt; ook overwinteren de Eieren en Poppen, en ik hebbe uit eene in den Zonneſchyn hangende Pop, den 3. *January* 1769. op een zagten dag, den Vlinder zien uitſluipen.

KL.

ZOMER.

BESCHRYVINGE.

Voedzel.		*Röſel.*
	ſte Claſſe der Dagvlinders. Jo, *Linn.* p. 769. ſp. 131. de *Paauwoog.*	
	299.	
Brandenetels.	De gezellige geel- en zwartgeſtreepte *Doornrups**, uit de eerſte Claſſe der Dagvlinders. URTICA, *Linn.* p. 777. ſp. 167. de *kleine Aurelia.*	I. Deel. Dagvl. 1ſte Claſſe, *Tab.* IV. *Fig.* 1-7.
	300.	
Kruis- en Aalbeziën, Brandenetels, enz. ook zouden ze op de Hoppen en Ypen aazen.	De eenzaame *Doornrups*†, met den half geelen en half witten rug en een bruin lyf des	I. Deel. Dagvl. 1ſte Claſſe, *Tab.* V. *Fig.* 1-8.

* Zy komt, nevens haaren Vlinder, desgelyks tweemaal in 't jaar te voorſchyn, en de Najaars-Poppen overwinteren.

KL.

† Zo wel deze Rups, als haar Vlinder, komt insgelyks jaarlyks tweemaal te voorſchyn, en de Najaars-Pop overwintert.

KL.

ZOMER.

Voedzel.	BESCHRYVINGE.	*Röſel.*
	des Dagvlinders eerſte Claſſe. C. ALBUM, *Linn.* p. 778. ſp. 168. de *gehakkelde Aurelia*	
	301.	
Kleine Brandnetels, en Stokroozen, enz.	De eenzaame diklyvige *Doornrups**, des Dagvlinders eerſte Claſſe. ATALANTA, *Linn.* p. 779. ſp. 175. de *Nummer-Kapel.*	I. Deel. Dagvl. 1ſte Claſſe, *Tab.* VI. *Fig.* 1-6.
	302.	
Groote Brandnetels, enz. op ſchaduwachtige plaatzen.	Het gezellige, zwarte, bruingeſtreepte en gehoornde *Doornrupsje*†, uit de 1ſte	I. Deel. Dagvl. 1ſte Claſſe, *Tab.* VIII. *Fig.* 1-7.

I Claſſe

* Deze diklyvige Doornrups, en de Vlinder, komt ook tweemaal des jaars te voorſchyn; de Pop overwintert en de Rups is in July en September te vinden.

K L.

† Deze, en 't volgende Doornrupsje, behooren tot die ſoorten, welke zich nevens haare Vlinders tweemaal in 't jaar vertoonen; en de Najaars Poppen overwinteren.

K L.

ZOMER.

Voedzel.	BESCHRYVINGE.	*Röſel.*
	Claſſe. der Dagvlinders. PRORSA, *Linn.* p. 783. ſp. 202	
	303.	
Brandnetels.	Het zeer zwarte, gehoornde en gezellige *Doornrupsje*, des Dagvlinders eerſte Claſſe. LEUANA, *Linn.* p. 783 ſp. 201.	I. Deel. Dagvl. 1ſte Claſſe, *Tab.* IX. *Fig.* 1-6.
	304.	
Diſtel, Kardebenedikt, Kliſſen, Artichokken, Brandnetels en Malva.	De eenzaame geele en graauwe *Doornrups**, des Dagvlinders eerſte Claſſe. CARDUI, *Linn.* p. 774. ſp. 157. de *Diſtelvink.*	I. Deel. Dagvl. 1ſte Claſſe, *Tab.* X. *Fig.* 1-7.

* Ook deze behoort tot die ſoorten, die zo wel in haare Rupſen- als Poppengeſtalte tweemaal des jaars te vinden zyn, en als Najaars Poppen overwinteren. In 't jaar 1752. zyn ze op verſcheiden plaatzen van Duitſchland en in Saxen, Zwaben, Frankenland, in Ooſtenryk, en te Weenen zo veelvuldig geweeſt, dat zyne Keizerl. Majeſteit (zo als een voornaam Cavalier den Heer *Röſel* bericht heeft,) met veel genoegen de prachtige Poppen derzelven beſchouwd had. In 't jaar 1761. hadden wy ze in Neurenberg en daar omſtreeks ook menigvuldig.

KL.

ZOMER.

BESCHRYVINGE.

305.

Voedzel.		*Röſel.*
Venkel, geele Raapen, Pietercelie, Seldery, en Steenbreek.	De eenzaame ſchoongroene *Rups**, met zwarte dwarsſtreepen, en groote geele vlakken, uit de tweede Claſſe der Dagvlinders. MACHAON, *Linn.* p. 750. ſp. 33. de *Page de la Reine.*	I. Deel. Dagvl. 2de Claſſe, *Tab.* I. *Fig.* 1-5.

306.

Roode Kool, Pruimen, Sleeſtruiken Merveillen de Peru, Appel, Peeren, en Kwetzeboom bladeren, enz.	De eenzaame zwavelgeele *Rups*†, van de tweede	I. Deel. Dagvl. 2de Claſſe, *Tab.* II. *Fig.* 1-7.

I 2 Claſ-

* Ik hebbe deze Venkelrups ook reets in July volwaſſen gevonden, en in Auguſtus uit haare Pop den Vlinder bekomen. Van die genen, welken men in Auguſtus en September vindt, komen de Vlinders niet altoos nog in 't zelfde jaar te voorſchyn; veelen overwinteren en komen eerſt in 't volgende jaar uit de Pop; zommigen brengen zelfs in de Poppengeſtalte wel twee Winters door.

KL.

† Men vindt ze ook lieflyk groen en bruin rood gevlakt op Sleeſtruiken. Toen het in 't jaar 1769. den 17 January zagt weer maakte, kwam 'er uit de Pop van zodanig eene Rups, die ik in eene warme kamer bewaarde, een' Vlinder te voorſchyn, die anders niet, dan in 't begin der Lente, uitkomen.

KL.

ZOMER.

Voedzel.	BESCHRYVINGE.	*Röſel.*
	Claſſe der Dagvlinders. PODALIRIUS, *Linn.* p. 751. ſp. 36. de *Page du Roi.*	
	307.	
Kool en veele Moeskruiden, wilde Nachtvioolen, Moſtert, Radys, Kers, enz.	De ſchadelyke geele en graauwe *Rups**, des Dagvlinders tweede Claſſe. BRASSICA, *Linn.* p. 759. ſp. 75 de *Groote witte Kapel.*	I. Deel. Dagvl. 2de Claſſe, *Tab.* IV. *Fig* 1-6.

* Zy is eene dier ſoorten, welke als Rupſen en Vlinders tweemaal in 't jaar, en zomtyds in groote menigte, gezien worden, doch de Najaars Poppen overwinteren. Verſcheiden Schryvers hebben van het vogt, welk deze Vlinder na zyne komſt uit de Pop van zich geeft, den zogenaamden Bloedregen willen afleiden; doch daar dit vogt niet rood, maar bruinachtig is, zo kan zulks niet van hem, maar veeleer van den Vlinder *Cratægo*, of zogenaamde Boom-Witje verſtaan worden. Zie *Röſel* I. Deel, Dagvlinders tweede Claſſe, *Tab.* III.

ZOMER.

BESCHRYVINGE.

308.

Voedzel.

Kool en Moeskruid, wilde Nachtviool, Knoblook, Look zonder Look, *Reſedæ* en Radys enz.

De kleine dofgroene *Rups**, des Dagvlinders tweede Claſſe. RAPAE, *Linn.* p. 759. ſp. 76. het *kleine Witje*

I. Deel. Dagvl. 2de Claſſe, *Tab.* V. *Fig.* 1-5.

309.

Allerleie Kruiden en Struikgewaſſen, enz.

De zwarthairige *Beerenrups*, des Nachtvlinders der tweede Claſſe. CAJA, *Linn.* p. 819. ſp. 38. de *Ruige Beer*, *Letterhouts Uil.*

I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* I. *Fig.* 1-5.

310.

Alle Ooſtboomen, Eiken, Linden, Vuilboom, Haagedoorn en Wilgebladeren, enz.

De kleine, hairige, zwarte, roodgeſtreepte en wit

I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* XXI. *Fig.* 1-6.

* Ook deze Rups verſchynt, nevens haaren Vlinder, tweemaal in 't jaar, en de Najaars Poppen overwinteren. In 't jaar 1777. zag ik by zagt weer op den 25. February een zodanigen Vlinder uit zyne Pop, die in den Zonneſchyn geplaaſt was, voortkomen.

ZOMER.

BESCHRYVINGE.

Voedzel.		*Röſel.*
	gevlakte *Rups*, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders. In *Füeſzlin* Verz. der Zwitzerſche Inſecten, p. 35. n. 662. CYGNI SIMILIS, (de *Zwaan*) genaamd.	
	311.	
Alle Ooftboomen, Eikenſtruiken en Haagen, enz.	De gezellige, bruin-roodhairige ſchadelyke, *Boomrups*, des Nachtvlinders dertweede Claſſe. CHRYSORRHEA, *Linn.* p. 822. ſp. 45. het *Donskakkertje.*	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* XXII. *Fig.* 1-5.
	312.	
Peereboomen, Appel, Perſike Kwetzen en Kastanjeboomen.	De geele *Borſtelrups*, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders. PUDIBUNDA, *Linn.* p. 824. ſp. 54. de *geele Antiek.*	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* XXXVIII. *Fig.* 1-6.

ZOMER.

Voedzel.	BESCHRYVINGE.	*Röſel.*
	313.	
Kerſen, Peeren, Appelen, Pruimen, enz.	De dunne zwartbruine *Spanrups*, uit de derde Claſſe der Nachtvlinders. GEOM. ALNIARIA, *Linn.* p. 860. ſp. 205.	I. Deel. Nachtvl. 3de Claſſe, *Tab.* I. *Fig.* 1-6.
	314.	
Kruisbeziën en Aalbeziën, ook Sleedoornbladeren.	De graauwachtig witte *Spanrups*, met den geelen buik en zwarte vlakken op den rug des Nachtvlinders derde Claſſe. GEOM. GROSSULARIATA, *Linn.* p. 867 ſp. 242. het *Aalbeziën-Uiltje.*	I. Deel. Nachtvl. 3de Claſſe, *Tab.* II. *Fig.* 1-5.

* Zy komt niet, zo als *Röſel* bericht heeft, uit overwinterde Eieren te voorſchyn, maar reets in den Herfſt, en overwintert als Rups; in welke geſtalte zy van 't Voorjaar tot in den Zomer gevonden wordt.

ZOMER.

BESCHRYVINGE.

315.

Voedzel.

Alle Kool- en Moeskruiden, Diſtelen, Brand- en Doove Netels veelerleie ſtruiken, en Perſikebladeren; inzonderheid Tuin-Salade, of Latu.

De dikke, grasgroene en witgeſtreepte *Spanrups** des Nachtvlinders derde Claſſe. GAMMA, *Linn.* p. 843. ſp. 27. de *Gamma Vlinder*, de *Ypſilon*, het *Piſtooltje.*

Röſel.

I. Deel. Nachtvl. 3de Claſſe, *Tab.* V. *Fig.* 1-4.

316.

Wilgen, Eſpen, Popelier.

De kleine *Rups**, met den vleeſchverwigen ruggeſtreep, en twee roode ruggewratten

III. Deel. *Tab.* XLIII *Fig.* 1-5.

* Zy veranderen ten deele nog in den Herfſt in Vlinders, en ten deele overwinteren zy, als Rupſen of Poppen, en komen eerſt in 't Voorjaar als Vlinders te voorſchyn.

KL.

† Zommigen dezer Rupſen veranderen in den Herfſt nog in Vlinders; en uit de overwinterde Eieren komen zy alsdan in 't Voorjaar te voorſchyn; doch anderen overwinteren in de geſtalte van Poppen, en komen vervolgens in Mai als Vlinders uit hunne Poppen.

KL.

ZOMER.

BESCHRYVINGE.

Voedzel.		*Röſel.*
	ten, des Nachtvlinders tweede Claſſe. CURTULA, *Linn.* p. 823. ſp. 52.	
	317.	
Gras en Blaauwbeziën, Roozeboombladeren, als ook die van alle Ooftboomen, en meer andere.	De Veelvraat, of de groote zwarthairige *Rups*, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders. RUBI, *Linn.* p. 823. ſp. 21. de *Braamrups*,	III. Deel. *Tab.* XLIX. *Fig.* 1-6.
	318.	
Braambeziën, en Hondskerſe.	De bultige bruine *Rups*, met den verdeelden kop, en een paar om hoog ſtaande uitſteekzels, van de tweede Claſſe der Nachtvlinders. BATIS, *Linn.* p. 836. ſp. 97.	IV. Deel. *Tab.* XXVI. *Fig.* A. C.

ZOMER.

BESCHRYVINGE.

319.

Voedzel. | De schoone grasgroene *Rups*, met den ronden kop, zonder Doornen, des Dagvlinders eerste Classe ÆGERIA, *Linn.* p. 771. sp. 43. *het Bonte Zandoogje.* | *Rösel.*

Boschgras, enz. | IV. Deel. *Tab.* XXXIII. *Fig.* 3, 4. *Kleemanns* Byv. *Tab.* XIX. *Fig.* A. B.

320.

Drooge Insecten. | Eene den Insecten verzamelingen ten hoogsten schadelyke *Motrups*, des Nachtvlinders der vierde Classe. *Linn.* O. | I. Deel. Nachtvl. 4de Classe, *Tab.* XV. *Fig.* 1-6.

HERFST.

Beschryvinge.

321.

Voedzel.

Kruis- en Aalbeziën, Hoppen en Ypen.

De eenzaame *Doornrups*, met den half geelen en half witten rug, en een bruin lyf, des Nachtvlinders eerſte Claſſe. C. Album, *Linn.* p. 778. ſp. 68. de *gehakkelde Aurelia.*

Röſel.

I. Deel. Dagvl. 1ſte Claſſe, *Tab.* V. *Fig.* 1-8.

322.

Wilgen, Sleeſtruiken, Ooftboomen, zwarte Popelieren, enz.

De eenzaame, blaauwhoornige, groene *Rups*, met ſchuinſe witte zydeſtreepen, ook zomtyds met veel karmynroode vlakken, des Nachtvlinders eerſte Claſſe. Sphinx Ocellata, *Linn.* p. 796. ſp. 1. de *Paauwenoog Pylſtaart.*

I. Deel. Nachtvl. 1ſte Claſſe *Tab.* I. *Fig.* 1-4. en III. Deel. *Tab.* XXXVIII. *Fig.* 4.

HERFST.

Beschryvinge.

Voedzel.	323.	*Röſel.*
Alle Koolgewaſſen, ook Mosdiſtel, Zuuring, en breede Weegbree.	De ſchadelyke, gladde, bruine *Kruidrups**, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders. Brassica, *Linn.* p. 852. ſp. 163. de *Koolrups.*	I. Deel. Nachtv. 2de Claſſe, *Tab.* XXIX. *Fig.* 1-5.
Mosdiſtel, Tuin-Salade, Hennip, Doove Netels, Tabak, de bladeren van geele Raapen en groene Erwten, Vlier.	324. De gladde, dofgroene, geſchubde *Rups*, des Nachtvlinders tweede Claſſe. Persicaria, *Linn.* p. 847. ſp. 142. de *Zwaan-Uil.*	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* XXX. *Fig* 1-5.
Peeren, zomtyds ook Appel- en Kwetzeboomen, als mede Perſiken en Kaſtanjeboomen.	325. De geele *Borſtelrups*, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders. Pudibunda, *Linn.* p. 824. ſp. 54. de *Geele Antiek.*	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* XXXVIII. *Fig.* 1-6.

* Men vindt ze zomtyds ook in *Juny* reets volwaſſen.

HERFST.

BESCHRYVINGE.

326.

Voedzel.

Raapenloof, Zuuring, Weegbree, Mosdiſtel, Roozen, Hondskerſe, Aalbeziën, Kwetzenbladeren, &c.

De ſtyfhairige bruine *Rups**, van de tweede Claſſe der Nachtvlinders. FULIGINOSA, *Linn.* p. 836. ſp. 95. het *Winterbeertje.*

Röſel.

I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* XLIII. *Fig.* 1-6.

327.

Mosdiſtel, enz.

De zwarte en ſtyfhairige *Rups*, met een geelen ruggeſtreep, des Nachtvlinders der tweede Claſſe. LUBRICIPEDA, *Linn.* p. 829. ſp. 69ᵉ. de *witte Lospoot.*

I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* XLVI. *Fig.* 1-8.

328.

Mosdiſtel, Tuin-Salade, Brandnetels, Framboizen, en breede Weegbree.

De witachtige, of ligt bruine, hairige

I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* XLVII. *Fig.* 1-8.

* Zy overwintert zo wel in de geſtalte van Rups als van Pop. In 't begin van Mai kruipt de Vlinder uit de overwinterde Pop, doch uit de Pop der overwinterde Rups eerſt in Juny en July.

HERFST.

BESCHRYVINGE.

Voedzel.		*Röſel.*
	rige, geknobbelde en geſtreepte *Rups*, des Nachtvlinders der tweede Claſſe. LUBRICIPEDA, *Linn.* p. 829. ſp. 69[b]. de *geele Los-poot.*	
	329.	
Volwaſſen Aspargiekruid, Salade, Kool, Ganzediſtel, enz.	De Aspergie *Rups*, met den rooden zydeſtreep des Nachtvlinders der tweede Claſſe. Deze naam ontbreekt by *Linnæus*; doch zou volgens den Heer *van Rottenburg*, in 't IX ſtuk des Natuur Onderzoekers, *p.* 131. PH. TRIFOLII zyn.	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* XLVIII. *Fig.* 1-6.
	330.	
Kruiswortel.	Het ſchoone *St. Jacobs Rupsje*, des	I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* XLIX. *Fig.* 1-6.

HERFST.

BESCHRYVINGE.

Voedzel.	des Nachtvlinders der tweede Classe. JACOBAEA, *Linn.* p. 839. sp. 111. het *Zanduiltje.*	*Röſel.*
	331.	
Harſtbuilen, van den Pyn- of Sporkenboom, enz.	De *Motrups*, uit de vierde Classe der Nachtvlinders. RESINELLA, *Linn.* p. 892. sp. 406. het *Harſtuiltje.*	I. Deel. Nachtvl. 4de Classe, *Tab.* XVI. *Fig.* 1-5.
	332.	
Op Sparreboomen, enz.	De bruine *Rups*, met een breeden witten ruggeſtreep en twee zwarte en witte ruggeborſtels des Nachtvlinders tweede Classe.	III. Deel. *Tab.* XLVIII. *Fig.* 1.
	333.	
Raapenloof, enz.	De aardbruine *Rups*, met zwarte op	III. Deel. *Tab.* LXXI. *Fig. f.* 13.

HERFST.

BESCHRYVINGE.

Voedzel.		*Röſel.*
	op den rug ſtaande ſchubachtige vlakken, uit de tweede Claſſe der Nachtvlinders.	
	334.	
Linden, Peeren, Appel- en andere Bladeren.	De bruinhairige *Beerenrups*, van de tweede Claſſe der Nachtvlinders. MATRONULA, *Linn.* p. 835. ſp. 92	IV. Deel. *Tab.* IV. *Fig.* 4. en III. Deel. *Tab.* XXXIX. *Fig.* 1, 2.
	335.	
Braambeziën en Hondskerſen.	De bultige bruine *Rups*, met een verdeelden kop, en een paar in de hoogte ſtaande uitſteekzels, van de tweede Claſſe der Nachtvlinders. BATIS, *Linn.* p. 836. ſp. 97.	IV. Deel. *Tab.* XXVI. *Fig.* A.C.

LENTE.
ZOMER,
HERFST.

BESCHRYVINGE.

336.

Voedzel.

De hairen van verſcheiden Pelswerken.

De het Peltswerk zeer ſchadelyke *Motrups*, uit de vierde Claſſe der Nachtvlinders. PELLIONELLA, et SARCITELLA, *Linn* p. 888. ſp. 372. 373 de *Pelts*- en *Kleeder*- *Mot.*

Röſel.

I. Deel. Nachtvl. 4de Claſſe, *Tab.* XVII *Fig.* 1-8.

ZOMER,
HERFST,
WINTER.

BESCHRYVINGE.

337.

Het ſtinkend ſap van vermolmd Eikenhout, ook van Wilgen, Kwetzen en Appelboomen.

De groote roode vleeſchverwige *Houtrups**, uit de K twee-

I. Deel. Nachtvl. 2de Claſſe, *Tab.* XVIII. *Fig.* 1-8.

* Dewyl ze tot haaren Wasdom meer dan een jaar noodig heeft, zo zal men ze zomtyds in het binnenſte van vermolmde of rottende Eiken, Wilgen, Kwetzen en Appelboomen in 't voorjaar aantreffen. Doch zy heeft zeker in den Zomer reeds van buiten af begonnen te eeten; alzo zy als dan uit het Ey komt.

	ZOMER, HERFST, WINTER.	
	BESCHRYVINGE.	
Voedzel.		*Roſel.*
	tweede Claſſe der Nachtvlinders. Cossus, *Linn.* p. 827. ſp. 63. de *Houtuil.*	
	338.	
Waſch, in de Byekorven.	De *Byenmot**, des Nachtvlinders vierde Claſſe. MELLONELLA, *Linn.* p. 888. ſp. 375. de *Honiglikker*, de *Byenmot.*	III. Deel. *Tab.* XLI. *Fig.* 1-7.

* Schoon deze Byenmot het ganſche jaar door in alle maanden en dus ook in 't voorjaar in de Byekorven overwinterd gevonden worde; heeft men ze echter onder deze jaargetyden geſteld, om dat de Vlinder doorgaans in *July* zyne Eieren gewoon is te leggen.

NAAMLYST
DER
PLANTEN,
VOLGENS HET SAMENSTEL
VAN
LINNÆUS,
IN DEN
TYDWYZER DER RUPSEN
GEMELD.

NAAMLYST DER PLANTEN.

Aalbeziën.	Johannisbirn.	Ribes Rubrum L. sp. 290. N. 1.
Aardappel of Kartoffels.	Erdbirnen oder Kartoffeln.	Solanum tuberosa L. sp. 265. N. 10.
Aardbeziën.	Erdbeern.	Fragaria Fesca L. sp. 708. N. 1.
Abeel-Boom.	Weiser Pappelbaum.	Populus Alba L. sp. 1463. N. 1.
Aborn.	Ahorn.	AcerPseudo-platanus L. sp. 1495. N. 2.
Akeley.	Ackeley.	Aquilegia Vulgaris L. sp. 752. N. 1.
Alsem.	Wermuth.	Artemisia absynthum L. sp. 1188. N. 14.
Anjelier.	Nelkenstöcke.	Dianthus Caryophylus L. sp. 587. N. 6.
Appelboom.	Apfelbaum.	Pyrus Malus L. sp. 686 N. 2.
Artisjokken.	Artischokken.	Cynara Scolymus L. sp. 1159. N. 1.
Aspergie.	Spargelkraut.	Asparagus officinalis L. sp. 448. N. 1.

Averone of Averuit	Staubwurz.	Artemisia Campestris L. sp. 1185. N. 4.
Bergkers.	Bergkresse.	Cardaminis Impatiens L. sp. 914. N. 3.
Berkeboom.	Birkenbaum.	Betula Alba L. sp. 1393. N. 1.
Bernagie of Ossentong,	Boretsch oder Ochsenzung /	Borago officinalis L. sp. 197. N. 1.
Beukeboom.	Buchen.	Fagus Sylvatica L. sp. 1416. N. 3.
Beursjeskruid.	Taschelkraut.	Thlaspi Bursa pastoris L. sp. 903. N. 10.
Blauwbeziën.	Heidebeer.	Vacinium Myrtillus L. sp. 498. N. 1.
Boogbout.	Massholder.	Acer Campestris L. sp. 1497. N. 7.
Bosch-gras.	Busch-Gras.	Juncus Pilosus L. sp. 468. N. 15.
Braambeziën.	Brombeer.	Rubus fruticosus. L. sp. 707. N. 5.
Brand Netelen (Groote.)	Waldbrennesseln.	Urtica dioica L. sp. 1396. N. 6.
Brandnetelen.	Brennesseln.	Urtica urens. L. sp. 1396. N. 5.
Brem (gemeene)	Genst.	Spartium scoparium L. sp. 996. N. 8.
Breuk (Groot)-of Wondkruid.	Grosses Bruchkraut oder Wundkraut.	Sedum telephium L. sp. 616. N. 2.

Breukkruid.	Sanikkel.	Sanicula Europea L. sp. 339. N. 1.
Byvoet. (Wilde)	Wilder Beyfuß.	Artemisia vulgaris L. sp. 1188. N. 16.
Cicorey.	Wegwarten.	Cichorium intybus L. sp. 1142. N. 1.
Denneboom.	Tannen.	Pinus Abies L. sp. 1421. N. 11.
Distel. (Ganze)	Hasenkohl.	Sonchus oleraceus L. sp. 1116. N. 1.
Distel (Melk.)	Milchdistel.	Carduus Marianus L. sp. 1153. N. 14
Distel. (Mosch)	Moos-distel.	Sonchus oleraceus L. sp. 1116. N. 5.
Doove Netels.	Taube Nesseln.	Lamium Album L. sp. 809. N. 5.
Duinbeziën.	Wegdoorn.	Rhamnus Catharticus L. sp. 279. N. 1
Duizendblad.	Schaafgarben.	Achilea Millefolium L. sp. 1267. N. 18.
Duizendknoop.	Wegtritt.	Polygonum Avicolarum L. sp. 513. N. 15.
Eerenprys.	Ehrenpreises.	Veronica L. sp. 12.
Eiken.	Eichen.	Quercus Robur L. sp. 1414. N. 12.
Elfrank.	Je länger je lieber.	Solanum dulcamara L. sp. 264. N. 5.
Elzeboom.	Erlenbaum.	Betula Alnus L. sp. 1394. N. 5.
Erten.	Erbsen.	Pisum Satisum L. sp. 1026. N. 1.

Eſchdoorn (Kleine) Booghout.	Maszholder.	Acer Campeſtris L ſp. 1497. N. 7.
Eſch-doorn.	Ahorn.	AcerPſeudo-platanus L. ſp. 1495. N. 2.
Eſſchenboom.	Eſchen Baum.	Fraxinus Excelſior L. ſp. 1509. N. 1.
Espenboom of Ratellaar.	Espenbaum.	Populus Tremula L. ſp. 1464. N. 2.
Framboizen.	Hind oder Holbeer.	Rubus Idœus L. ſp. 706. N 1.
Ganzediſtel.	Haſenkohl.	Sonchus oleraceus L. ſp. 1116. N. 5.
Ganzevoet.	Gänſefusz.	Chenopodium Rubrum L. ſp. 318. N. 3.
Geiteblad of Kaperfoeli.	Geiſſbluth.	Lonicera Periclymenum L. ſp. 247. N. 3.
Haane-beuk.	Hayn oder Stein Buchen.	Carpinus Betulæ L. ſp. 1410. N. 1.
Haaze Latouw.	Haſenkohl.	Sonchus oleraceus L. ſp. 1116. N. 5.
Hagedoorn.	Weitsdorn.	Cratœgus oxyacantha L. ſp. 683 N. 8.
Harders Tasjes.	Taſchelkraut.	Thlaspi Burſa paſtoris L. ſp. 903. N. 10.
Haver Eſch.	Ahorn.	AcerPſeudo-platanus L. ſp. 1495. N. 2.
Hazelaar of Hazelnotenboom.	Haſelnusſtauden.	Corylus Avalana. L. ſp. 1417. N. 1.

Heidebeziën.	Zwartsbeer / Heidebeer.	Vacinium Myrtilis L. sp. 498. N. 1.
Hennip.	Hanf.	Canabis Sativa L. sp. 1457. N. 1.
Hinnebeziën.	Himbeerstrauch.	Rubus Idœus L. sp. 706. N. 1.
Hondskarse met roode vrugt.	Heckenkirschen mit rothen früchten.	Lonicera Xylosteum L. sp. 248. N. 6.
Hondskarse met zwarte vrugt.	Heckenkirschen mit zwartzen frücht.	Lonicera Cœrulea L. 249. N. 9.
Honds- of Kweekgras.	Hunds- oder Queckengras.	Triticum repens L. sp 128. N. 9.
Hondsribbe, smalle of kleine Weegbree.	Spitziger Wegerich.	Plantago Lanceolata L. sp. 164. N. 6.
Hoppe.	Hopfenpflanzen.	Humulus Lupulus L. sp. 1457. N. 1.
Jasmyn.	Jesmin.	Phyladelphus Coronarus L. sp. 671. N. 1.
Jokboom.	Hayn oder Stein Buchen.	Carpinus Betulæ L. sp. 1416. N. 1.
Kamillen. (Roomsche)	Rheinische Camillen.	Matricaria Suaveolens L. sp. 1256. N. 5.
Kaperfoeli.	Rose von Jericho / Geissbluth.	Lonicera periclymenum L. sp. 247. N. 3.
Kardebenedikt.	Cardobenedictenkraut.	Centaurea Benedicta L. sp. 1296. N. 42.
Karsen.	Kirschen.	Prunus Cerasis L. sp. 679. N. 9.

Kars (Honds) met roode Vrugt.	Heckenkirschen mit rothen früchten.	Lonicera Xylosteum L. sp. 248. N. 6.
Kars (Honds) met zwarte vrugt.	Heckenkirschen mit zwartzen früchte.	Lonicera Cœrulea L. sp. 249. N. 9.
Kars. (Vogel)	Vogel Kirschen.	Prunus Padus L. sp. 677. N. 1.
Kartoffelen.	Kartoffeln.	Solanum tuberosa L. sp. 265. N. 10.
Kastanjeboom.	Castanienbaum.	Fagus Castanea. L. sp. 1416. N. 1.
Kastanje (Wilde) Boom.	Wilder Castanien Baum.	Æsculus Hypocastaneum L. sp. 488. N. 1.
Kattenbout.	Bruchweiden.	Salix fragillis L. sp. 1443. N. 8.
Kattekruid of Nipte	Katzenkraut.	Nepeta Cataria. L. sp. 796. N. 1.
Keelkruid.	Hainweide.	Liguſtrum Vulgaris L. sp. 10. N. 1.
Klaver.	Wiesen Klee.	Trifolium Pratense L. sp. 1082. N. 19
Kleefkruid.	Kleber.	Galium aparine L. sp. 157. N. 22.
Kliſſen, Klaſſen.	Kletten.	Arctium Lappa L. sp. 1143. N. 1.
Knolle.	Gelbe Rüben.	Braſſica rapæ L. sp. 931. N. 4.
Knoplook.	Knoblauch.	Allium Sativum L. sp. 425. N. 10.
Kool.	Garten Kohl.	Braſſica Oleracea L. sp. 932. N. 5.

Kool. (Wilde)	Waldkohl.	Braſſica Campeſtris L. ſp. 931. N. 2.
Kraak-of Heidebeziën.	Schwartzbeer.	Vacinium Myrtilis L. ſp. 498. N. 1.
Kruidje roert me niet.	Springſaamenkraut.	Impatiens Noli-tangere L. ſp. 1329. N. 7.
Kruisbeziën.	Stachelbeernſtauden	Ribes uva Criſpa L. ſp. 492. N. 7.
Kruiswortel.	Groſſes Grindkraut oder Jacobskraut.	Senecio vulgaris L. ſp. 1216. N. 7.
Kuiſchboom.	Keuſchlamms.	Vitex Agnus Caſtus L. ſp. 890. N. 1.
Kweekgras.	Quecken oder Hundsgras.	Triticum Repens L. ſp. 128. N. 9.
Kweepeer.	Quitten.	Pyrus Cydonia L. ſp. 687. N. 4.
Kwetſenboom.	Zwetſchenbaum.	Prunus Domeſtica L. ſp. 680. N. 11
Latuw.	Gartenlattich.	Lactuca Sativa L. ſp. 1118. N. 2.
Liguſtrum.	Hartriegel.	Liguſtrum vulgaris L. ſp. 10. N. 1.
Lindeboom.	Lindebaum.	Tilia Europœa L. ſp. 733. N. 1.
Look zonder Look.	Leuchel Salz oder Knoblauchskraut.	Eryſimum alliatia L. ſp. 922. N. 3.
Luitenhout.	Ahorn.	Acer Pſeudo-platanus L. ſp. 1495 N. 2.
Malva.	Pappel.	Malva Sylveſtris L. ſp. 969. N. 13.

Meekrap.	Färberröthe.	Rubia Tinctorum. L. ſp. 158. N. 1.
Melde.	Melde.	Atriplex Hortenſis L. ſp. 1193. N. 7.
Melk-Diſtel.	Milchdiſtel.	Carduus Marianus L. ſp. 1153. N. 14
Moerbeziënboom.	Mäulbeer Baum.	Morus alba L. ſp. 1398. N. 1.
Moerelleboom.	Weichſel.	Prunus Ceraſus auſtrea L. ſp. 675. N 9.
Mond-Houd.	Mundweiden.	Liguſtrum vulgaris L. ſp. 10. N. 1.
Moſch-Diſtel.	Maos-diſtel.	Sonchus oleraceus L. ſp. 1116. N. 5.
Moſtaart. (*witte*)	Gartenſenf.	Sinapis alba L. ſp. 933. N. 2.
Moſtaart. (*zwarte*)	Senf.	S. Nigra L. ſp. 933. N. 3.
Muisoor.	Mauſöhrlein.	Hieracium piloſella L. ſp. 1125. N. 4
Muurbloem.	Gelbe Violen.	Cheiranthus Cheiri L. ſp. 924. N. 2.
Netelen. (*Brand*)	Brennneſſeln.	Urtica Urens. L. ſp. 1396. N. 5.
Netelen. (*groote Brand*)	Wald Brennneſſeln.	Urtica Dioica. L. ſp. 1396. N. 6.
Netels. (*Doove*)	Taube Neſſeln.	Lamium album L. ſp. 809. N. 5.
Nipte.	Katzenkraut.	Nepeta Catarial L. ſp. 796 N. 1.
Ojevaarsbek.	Storchſchnabel.	Geranium Cicutarium L. ſp. 957. N. 26

Oleander.	Oleander.	Nerium Oleander L. ſp. 305. N. 1.
Olme of Ypenboom.	Rüſtern.	Ulmus Campeſtris L. ſp. 327. N. 1.
Onzer lieven Vrouwen bedſtroo.	Unſer Frauen Bettſtroh.	Galium Verum L. L. ſp. 155. N. 12.
Oſſetong.	Ochſenzung.	Borago officinalis L. ſp. 197. N. 1.
Peereboom.	Birnbaum.	Pirus Communis L. ſp. 686. N. 1.
Perſikeboom.	Perſichbaum.	Amygdalus Perſica L. ſp. 676. N. 1.
Perſikkruid.	Flöhkraut.	Polygonum Perſicaria L. ſp. 518. N. 10.
Peterſelie.	Piterſilienkraut.	Apium Petroſelium L. ſp. 379. N. 1.
Popelier (witte) of Abeelboom.	Weiſer Pappelbaum.	Populus alba L. ſp. 1463. N. 1.
Popelieren. (zwarte)	Almerbaum.	Populus Nigra L. ſp. 1462. N. 3.
Pruim. (ſlee)	Schlehen.	Prunus ſpinoſa L. ſp. 681. N. 13.
Pruimenboom.	Pflaumenbaum.	Prunus domeſtica L. ſp. 680. N. 11.
Pynboom.	Kienſchzoten.	Pinus Sylveſtris L. ſp. 1418. N. 1.
Raape, Knolle,	Gelbe Rüben.	Braſſica rapae L. ſp. 931. N. 4.
Radys.	Rettig.	Raphanus Sativus L. ſp. 935. N. 1.

Ratelaar.	Espenbaum.	Populus Tremula. L. sp. 1464. N. 2
Reinwilg.	Hainweide.	Liguſtrum vulgaris L sp 10. N. 1.
Rhynbloemen.	Rheinblumen.	Guaphalium Stœchas L. sp. 1193. N. 3.
Ridderspooren. (Wilde)	Ritterspoꝛn in felden.	Delphinium Conſolida L. sp. 748 N. 1.
Ridderspooren.	Ritterspoꝛn im garten.	Delphinium Ajacis L. sp. 748. N. 2.
Roozen.	Roſenſträuche.	Roſa L sp. 703.
Ronde ruige Wilg.	Saalweiden.	Salix Caprea L. sp. 1448. N. 28
Rynbeziëndoorn.	Wegdooꝛn.	Rhamnus cahtharticus L. sp. 297. N. 1.
Sanikkel of Breukkruid.	Sanikkel.	Sanicula Europea L. sp. 339. N. 1.
Scabioſen.	Klein Grind oder Scabioſenkraut.	Scabioſa arvenſis L. sp. 143. N. 10.
Sellery.	Seleryplaub.	Apium Graveolens L. sp. 379. N. 2.
Sleebeziën.	Schlehenſtauden.	Prunus Spinoſa. L. sp. 681. N. 13.
Spaanſe Vlier.	Lilac oder Syringa Spaniſcher Hollunder.	Syringa Vulgaris L. sp. 11. N. 1.
Sparreboomen.	Föhrenbäume.	Pinus Sylveſtris. L. sp. 1418. N. 1.

Sicory.	Wegwarten.	Cichorium Intybus L. ſp. 1142. N. 1.
Standelkruid.	Knabenkraut.	Orchus Bifolia L. ſp. 1331. N. 8.
Steenbreek.	Steinbruch.	PimpinellaSaxifraga L. ſp. 378. N. 1.
Steenklaver.	Steinklee.	Trifolium agrarium L. ſp. 1087. N. 39.
Stok Roos.	Groſſe Gartenpappeln.	Alcea Roſea L. ſp. 966. N. 1.
Syringe.	Lilac oder Springa Spaniſcher Hollunder.	Syringa Vulgaris L. ſp. 11. N. 1.
Tabak.	Toback.	Nicotiana Tabacum L. ſp. 258. N. 3.
Tasjeskruid	Taſchelkraut.	Thlaspi Burſa paſtoris L. ſp. 903. N. 10.
Toortskruit.	Wollkraut.	Verbascum Thapſus L. ſp. 252. N. 1.
Tuin-Salade.	Gartenſalat.	Lactuca Sativa L. ſp. 1118. N. 2.
Venkel.	Feuchel.	Anethum foeniculum L. ſp. 377. N. 2
Verkensgras.	Wegtritt.	Polygonum Avicolare L. ſp. 519. N. 15.
Vioolen.	Nachtviolen.	Viola Tricolor L. ſp. 1326. N. 15.
Vioolen. (Wilde roode nagt)	Wilde rothen Nachtveils.	Hesperis Triſtis L. ſp. 927. N. 1.

Vlier.	Hollunder.	Sambucus Nigra L. ſp. 385. N. 3.
Vlookruid, Perſikkruid.	Flöhkraut.	Polygonum Perſicaria L. ſp. 518. N. 10.
Vogelkars.	Vogelkirſchen	Prunus Padus L. ſp. 677. N. 1.
Vuilboom.	Faulbaum.	Rhamnus Frangula L. ſp. 280 N. 5.
Walſtroo.	Waldſtroh / Lubkraut Sternkraut.	Galium verum L. ſp. 155. N. 12.
Waterpeper.	Waſſerpfeffer.	Polygonum Hydropiper L. ſp. 517. N. 9.
Wederik.	Weiderich.	Lyſimachia Vulgaris L. ſp. 209. N. 1
Wederik. (Virginiſche)	Virginiſche Weiderich.	Oenothera fruticoſa L. ſp. 442. N. 6.
Wederik. (Groote roode)	Groſſe rothe Weiderich.	Epilobium hirſitum L. ſp. 494. N. 3
Weegbree. (groote of breede)	Breite Wegerich.	Plantago Major L. ſp. 163. N. 1.
Weegbree. (kleine of ſmalle	Spitziger Wegerich.	Plantago Lanceolata L. ſp. 164. N. 6.
Weed.	Weidt.	Iſatis Tinctoria L. ſp. 936. N. 1.
Wegdoorn.	Wegdorn.	Rhamnus Cathatcus L. ſp. 279. N. 1.
Weggras.	Wegtritt.	Polygonum Avicolarum L. ſp. 519. N. 15.

Wielboom.	Hapnbuchen / Steinbuchen.	Carpinus Betulæ L. ſp. 1416. N. 1.
Wilgen. (Wolle)	Wollenweiden.	Salix Caprea L. ſp. 1448. N. 28.
Wilg. (ronde ruige)	Saalweiden.	Salix Caprea L. ſp. 1448. N. 28.
Winde. (Witte en roozen roode)	Weiſen und roſenfarbiger Windig.	Convolvulus ſepium L. ſp. 218. N. 1.
Wolfsmelk.	Wolfsmilch.	Euphorbia Cyparisſius L. ſp. 661. N. 55
Wollekruid.	Wollkraut.	Verbascum Thapſus L. ſp. 252. N. 1
Wondkruit.	Groſſes Bruch oder Wundkraut.	Sedum Tellephium L. ſp. 616 N. 2.
Wyngaard.	Wynſtock.	Vitis Vinifera L. ſp. 293.
Wynruite.	Weinraute.	Ruta Graveolens L. ſp. 548. N. 1.
Ypenboom.	Rüſtern.	Ulmus Campeſtris L. ſp. 327. N. 1.
Zuuring.	Sauerampfer.	Rumex Acetoſa L. ſp. 483. N. 24.

60127